


## Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

### B.322

### Saliceti arbustivi ripariali mediterranei

Ultimo aggiornamento: 07/10/2025



DISTRIBUZIONE

#### Descrizione

Cespuglieti ripariali pionieri, sia fitti e compatti sia radi, che si sviluppano lungo i greti sassosi e ciottolosi delle aree a bioclina mediterraneo. Sono caratterizzati dalla presenza nello strato arbustivo di diverse specie di salici presenti anche in ambito temperato (*Salix eleagnos*, *Salix purpurea* e *Salix triandra*) a cui si associano specie stenomediterranee come *Salix pedicellata* e *Salix amplexicaulis* o endemiche come *Salix oropotamica* e *Salix tyrrhenica*.

Si sviluppano su porzioni fluviali sottoposte a frequenti inondazioni sia lungo le sponde sia su isolotti allungati in alveo. Le oscillazioni stagionali della portata fluviale comportano l'alternanza di periodi prolungati di siccità e di sommersione, rendendo l'ambiente estremo, e selezionando le specie vegetali che riescono ad instaurarsi. L'attività distruttiva delle piene maggiori può causare la scomparsa di numerosi individui ma, se l'assetto geomorfologico non viene alterato, l'habitat ha un'ottima capacità di rigenerarsi velocemente grazie alla propensione dei salici di rinnovarsi a partire da polloni o rami spezzati.

L'habitat è diffuso dagli ambiti montani fino al basso corso dei torrenti dell'Italia meridionale e insulare. L'habitat è presente in Sicilia, Sardegna, nell'Italia meridionale e risale in ambito costiero mediterraneo in Italia centrale; è di tipo azonale legato agli ambiti fluviali, alla granulometria dei depositi d'alveo ed alla frequenza degli eventi di piena.

#### Regione Biogeografica

Mediterranea

## Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

### Macrobioclima

Mediterraneo

### Piano Altitudinale

Planiziale/Collinare/Montano

### Geoambienti

L'habitat si sviluppa negli alvei sassosi, ghiaiosi e ciottolosi sia lungo la riva che su isole vegetate all'interno di ampi greti. Il tratto fluviale dove più frequentemente si riscontra è quello montano collinare o, comunque, in tutti quei casi in cui le acque correnti possiedono elevata energia che non permette la deposizione di materiale fine.

### Riferimenti sintassonomici

*Carici microcarpae-Salicetum atrocinereae* Angius & Bacchetta 2009;  
*Salicetum albo-brutiae* Brullo et Spampinato 1997;  
*Salicetum lambertiano-elaeagni* Brullo & Spampinato 1997;  
*Euonymo europaei-Salicetum lambertianae* Raimondo, Domina & Di Gristina 2021;  
*Saponario officinalis-Salicetum purpureae* (Br.-Bl. 1930) Tchou 1946;  
*Osmundo-Salicetum pedicellatae* Brullo & Spampinato 1990.

### Specie guida

|                                                                                   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <i>Salix amplexicaulis</i> Bory                                                   |  |  |
| <i>Salix atrocinerea</i> Brot. subsp. <i>atrocinerea</i>                          |  |  |
| <i>Salix brutia</i> Brullo & Spamp.                                               |  |  |
| <i>Salix pedicellata</i> Desf.                                                    |  |  |
| <i>Salix purpurea</i> L. subsp. <i>eburnea</i> (Borzi) Cif. & Giacom. ex Pignatti |  |  |
| <i>Salix purpurea</i> L. subsp. <i>purpurea</i>                                   |  |  |
| <i>Salix tyrrhenica</i> Brullo, Scelsi & Spamp.                                   |  |  |

### Interesse conservazionistico nazionale

Habitat ad elevata naturalità, pioniero e dinamico, limitato in strette fasce spesso discontinue. Questo habitat e gli altri ambienti legati al sistema dei corsi d'acqua, nel loro insieme, possono svolgere l'importante funzione di corridoio ecologico, in particolare all'interno di contesti antropici. Sono inoltre presenti numerosi endemismi caratterizzanti.

## Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

### Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

#### Palaearctic 2001

|   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| ~ | 44.12-Lowland and collinar riverine willow scrub |
|---|--------------------------------------------------|

Palaearctic circoscrive questo habitat ad ambiti collinari e planiziali; Carta della natura distingue gli arbusteti ripariali italiani su base bioclimatica.

#### EUNIS 2012

|   |                                                        |
|---|--------------------------------------------------------|
| ~ | F9.12-Lowland and collinar riverine <i>Salix</i> scrub |
|---|--------------------------------------------------------|

EUNIS circoscrive questo habitat ad ambiti collinari e planiziali; Carta della natura distingue gli arbusteti ripariali italiani su base bioclimatica.

#### European Red List of Habitats 2022

|    |                                          |                                      |  |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <> | F9.1-Temperate and boreal riparian scrub | Categoria EU28: <i>Least Concern</i> |  |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------|--|

### Autori

Scheda: Alberto Cardillo

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco