


Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

B.323

Cespuglieti e boscaglie ripariali a tamerici, oleandri e agnocasti

Ultimo aggiornamento: 07/10/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Cespuglieti igrofilo e ripariali dominati da *Tamarix* spp., *Nerium oleander* e *Vitex agnus-castus* che si sviluppano lungo i torrenti in ambito bioclimatico mediterraneo. Tali formazioni si rinvengono di norma sui terrazzi asciutti per gran parte dell'anno e meno interessati dagli eventi di piena di corsi d'acqua temporanei, più raramente anche in corrispondenza dei corsi d'acqua permanenti ma con forti variazioni di portata. Rappresentano lo stadio più evoluto e stabile della vegetazione dei terrazzi dei torrenti nella fascia bioclimatica termomediterranea. Lungo i torrenti o i corsi d'acqua minori crea formazioni lineari, anche a galleria. *Tamarix* e *Vitex agnus-castus* sopportano anche terreni subsalsi e per questo risultano più diffusi nei tratti terminali di torrenti, lungo le foci ed in ambienti umidi costieri.

L'habitat è ben distribuito lungo la maggior parte dei corsi d'acqua intermittenti della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. In Italia centrale è segnalato in Toscana nell'isola di Capraia.

Regione Biogeografica

Mediterranea

Macrobioclima

Mediterraneo

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Piano Altitudinale

Costiero/Planiziale/Collinare

Geoambienti

Terrazzi fluviali asciutti per gran parte dell'anno o greti di corsi d'acqua temporanei della regione biogeografica mediterranea.

Riferimenti sintassonomici

Nerio oleandri-Tamaricetea africanae Braun-Blanq. & O.Bolòs 1958.

Specie guida

<i>Nerium oleander</i> L. subsp. <i>oleander</i>		
<i>Tamarix africana</i> Poir.		
<i>Tamarix canariensis</i> Willd.		
<i>Tamarix dalmatica</i> Baum		
<i>Tamarix gallica</i> L.		
<i>Vitex agnus-castus</i> L.		

Interesse conservazionistico nazionale

Habitat ad elevata naturalità, raro e stabile date le peculiari condizioni edafiche in cui si sviluppa, limitato in strette fasce spesso discontinue. Questo habitat e gli altri ambienti legati al sistema dei corsi d'acqua, nel loro insieme, possono svolgere l'importante funzione di corridoio ecologico, in particolare all'interno di contesti antropici.

A livello europeo l'interesse conservazionistico è contemplato in All.1 della Direttiva 92/43/CEE con l'habitat 92D0.

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaeartic 2001

=	44.81-Oleander, chaste tree and tamarisk galleries
---	--

EUNIS 2012

=	F9.31- <i>Nerium oleander</i> , <i>Vitex agnus-castus</i> and <i>Tamarix</i> galleries
---	--

Direttiva Habitat 92/43/CEE (EUR28)

=	92D0-Southern riparian galleries and thickets (<i>Nerio-Tamaricetea</i> and <i>Securinegion tinctoriae</i>)
---	---

Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

=	92D0-Gallerie e forteti ripari meridionali (<i>Nerio-Tamaricetea</i> e <i>Securinegion tinctoriae</i>)
---	--

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

European Red List of Habitats 2022

=	F9.3-Mediterranean riparian scrub	Categoria EU28: <i>Least Concern</i>	
---	-----------------------------------	--------------------------------------	--

Autori

Scheda: Alberto Cardillo

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco