


Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

B.324

Cespuglieti ripariali dominati da specie alloctone

Ultimo aggiornamento: 07/10/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Cespuglieti ripariali costituiti da specie alloctone, tra cui le più diffuse sono *Amorpha fruticosa*, *Reynoutria japonica* e *Buddleja davidii*. Queste specie esotiche possono creare formazioni arbustive compatte che rappresentano le principali formazioni di sostituzione dei cespuglieti a salici, o dei saliceti arborei, lungo i corsi d'acqua ed i canali dell'area pianiziale delle grandi pianure dell'Italia settentrionale; sebbene meno diffuse risultano tuttavia presenti lungo i fiumi di tutta la penisola italiana.

La loro attuale distribuzione è dovuta sia alla forza espansiva delle specie (ampio spettro ecologico, accrescimento rapido, vitalità dei semi e possibilità di riproduzioni vegetative) sia ad una non sempre corretta gestione dell'uomo, attuata attraverso avventati diradamenti e tagli a raso della vegetazione autoctona. Localmente può formare ecotopi anche di notevoli dimensioni.

Le singole specie, inoltre, possono svilupparsi nel sottobosco di pioppeti e di saliceti degradati; in questi casi l'ecotopo va assegnato all'habitat forestale di riferimento.

Regione Biogeografica

Alpina/Continentale/Mediterranea

Macrobioclina

Temperato/Mediterraneo

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Piano Altitudinale

Costiero/Planiziale/Collinare

Geoambienti

L'habitat si sviluppa lungo le rive dei fiumi nei loro tratti a bassa pendenza sia in ambito collinare ma più frequentemente nelle grandi pianure alluvionali con un flusso d'acqua caratterizzato da acque correnti a bassa o media energia. Cespuglieti ripariali di specie alloctone ed invasive possono rinvenirsi anche lungo canali, laghetti, vasche e casse d'espansione.

Riferimenti sintassonomici

Dato che questo habitat è caratterizzato da una grande eterogeneità, che le varie specie che lo popolano hanno caratteristiche diverse, che è sottoposto ad influenza antropica, pregressa e/o attuale e può trovarsi in differenti contesti biogeografici e climatici ed a stadi evolutivi di naturalizzazione diversi, non possono essere evidenziate fitocenosi tipiche.

Specie guida**Interesse conservazionistico nazionale**

Cespuglieti di specie alloctone di nessun interesse conservazionistico; nei casi in cui questi arbusteti risultino di carattere invasivo ai danni di formazioni naturali dovrebbero essere prese azioni per il loro controllo ed eradicazione in quanto capaci di soppiantare, o inquinare, habitat naturali anche di rilevante interesse conservazionistico.

Tuttavia, va sottolineato come spesso tali ambienti ripariali svolgano una funzione di corridoio ecologico e di rifugio per la fauna naturale, in particolar modo nelle grandi pianure alluvionali in cui frequentemente rappresentano uno dei pochi ambienti pseudo-naturali, in un ambito fortemente sottoposto alle pressioni antropiche dovute ad un'agricoltura industrializzata e ad un'urbanizzazione diffusa. Possono infine svolgere un'importante funzione per il mantenimento delle popolazioni degli insetti impollinatori.

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea**EUNIS 2012**

~ F9.35-Riparian stands of invasive shrubs

La categoria EUNIS è limitata geograficamente ad un'area compresa tra Romania e Croazia, attualmente l'habitat risulta diffuso anche in Italia.

Autori

Scheda: Alberto Cardillo

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco