

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

B.347**Boschi ripariali a pioppi**

Ultimo aggiornamento: 07/10/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Boschi igrofili ripariali dominati da pioppi (*Populus alba*, *P. nigra*, *P. canescens*); occupano o la porzione delle sponde meno interessata dalle piene dei fiumi e dei torrenti o le rive di laghi e stagni. Boschi spesso con struttura stratificata dominati anche in altezza dai pioppi a cui frequentemente si accompagnano altre specie igrofile arboree, come *Salix alba*, e arbustive. Si sviluppano su terreni sabbiosi e ciottolosi ben drenati dei terrazzi fluviali, in cui le acque esondano solo in occasione delle piene maggiori; questi boschi si rinvergono di norma nel corso medio o terminale dei fiumi.

L'habitat è diffuso in tutta la penisola italiana, in Sicilia e in Sardegna. In Italia settentrionale i boschi ripariali a pioppi risultano diffusi lungo i principali corsi d'acqua in ambito planiziale (Pianura Padana, Pianura Veneto-Friulana), localizzati e rari nel medio corso dei fiumi delle vallate alpine.

Habitat di tipo azonale è legato ad una buona disponibilità idrica senza ristagni prolungati sia in ambito fluviale che lacustre.

L'habitat può risultare parzialmente invaso da specie alloctone, nello strato arboreo la più frequente è sicuramente *Robinia pseudoacacia*, che occupano in particolar modo i margini dei boschi. Qualora la percentuale di specie alloctone sia dominante ecotopo va riferito all'habitat *Boschi e boscaglie ripariali dominati da specie alloctone* (B.34B).

Regione Biogeografica

Alpina/Continente/Mediterranea

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Macrobioclima

Temperato/Mediterraneo

Piano Altitudinale

Planiziale/Collinare

Geoambienti

Lungo i corsi d'acqua, i pioppeti si rinvergono di norma nei primi terrazzi fluviali, composti principalmente da sabbie e ciottoli, invasi regolarmente ma per brevi periodi dalle acque durante le piene maggiori. Si sviluppano dove le acque correnti hanno media o bassa energia, lungo la maggior parte dei corsi d'acqua della penisola.

Lungo le sponde lacustri possono formare boschetti, spesso lineari, quando queste non risultano particolarmente scoscese. Nelle grandi pianure alluvionali si riscontrano boschi di pioppo in prossimità di aree umide (laghetti, stagni, vasche, casse di espansione).

Riferimenti sintassonomici

Dioscoreo communis-*Populetum nigrae* Poldini et Vidali;
Fraxino oxycarpae-*Populetum canescentis* Fascetti 2004;
Populetum albae Br.-Bl. 1931 ex Tchou 1947;
Roso sempervirentis-*Populetum nigrae* Pedrotti et Gafta 1992;
Rubio longifoliae-*Populetum albae* Br.-Bl. & O. Bolòs 1957;
Salici-*Populetum nigrae* (Tüxen 1931) Meyer-Drees 1936;
Smilaco-*Populetum albae* Angius & Bacchetta 2009;
Urtico dioicae-*Populetum albae* Zanotti et Lanzarini 1994.

Specie guida

<i>Populus alba</i> L.	dominante e codominante	
<i>Populus canescens</i> (Aiton) Sm.	dominante e codominante	
<i>Populus nigra</i> L. subsp. <i>nigra</i>	dominante e codominante	

Interesse conservazionistico nazionale

Habitat ad elevata naturalità, limitato in strette fasce spesso discontinue; sebbene molto diffuso lungo i corsi d'acqua della penisola italiana, l'effettiva estensione degli ecotopi sul territorio nazionale risulta decisamente ridotta rispetto alla sua naturale dimensione a causa di una forte pressione antropica. L'intervento umano su questi ambienti può essere ricondotto principalmente ad interventi di disboscamento per ottenere nuove aree agricole, bonifiche e canali di drenaggio, piantagioni di cultivar specifici per la produzione di pasta di cellulosa, modificazioni del regime idrologico dei fiumi a causa di prelievi e sbarramenti lungo il corso d'acqua ed estrazione di ghiaia e sabbia dagli alvei.

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Questo habitat e gli altri ambienti legati al sistema dei corsi d'acqua, nel loro insieme, svolgono molto spesso l'importante funzione di corridoio ecologico, in particolare all'interno di contesti antropici.

A livello europeo l'interesse conservazionistico è contemplato in All.1 della Direttiva 92/43/CEE con l'habitat 92A0, e in All. A della *European Red List of habitats* con l'habitat G1.3, di categoria *Vulnerable*.

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaearctic 2001

=	44.61-Mediterranean riparian poplar forests
---	---

EUNIS 2012

=	G1.31-Mediterranean riparian <i>Populus</i> forests
---	---

Direttiva Habitat 92/43/CEE (EUR28)

<	92A0- <i>Salix alba</i> and <i>Populus alba</i> galleries
---	---

Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

<	92A0-Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>
---	--

European Red List of Habitats 2022

<	G1.1-Temperate and boreal softwood riparian woodland	Categoria EU28: <i>Near Threatened</i>	
<	G1.3-Mediterranean and Macaronesian riparian woodland	Categoria EU28: <i>Vulnerable</i>	

Autori

Scheda: Alberto Cardillo

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco