


Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

B.349

Boschi ripariali a *Fraxinus angustifolia*

Ultimo aggiornamento: 11/11/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Boschi planiziali, igrofilo delle pianure alluvionali dominati da *Fraxinus angustifolia* subsp. *oxycarpa*. Si sviluppano su suoli meno ricchi, più asciutti e con inondazioni meno pronunciate rispetto all'habitat dei *Boschi ripariali a pioppi* (B.347); sebbene il loro terreno rimanga umido per gran parte dell'anno e durante i periodi piovosi possono risultare anche allagati. Al frassino meridionale nello strato arboreo si accompagnano spesso *Ulmus minor*, *Populus alba* e *Acer campestre*, meno frequentemente *Alnus glutinosa*. Nelle radure, di norma, tendono a svilupparsi magnocariceti. In Italia meridionale sono note varianti dell'habitat con un denso strato arbustivo a *Laurus nobilis*.

L'habitat ha una distribuzione localizzata e discontinua lungo le pianure alluvionali della penisola, per lo più nei tratti terminali dei fiumi, dove la falda freatica è superficiale. Sul versante tirrenico ed in Sardegna si rinviene più frequentemente accompagnato con l'ontano nero; sul versante adriatico ed in Sicilia si associa maggiormente con pioppi e olmi.

Regione Biogeografica

Continente/Mediterranea

Macroclima

Temperato/Mediterraneo

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Piano Altitudinale

Planiziale

Geoambienti

Questi boschi, tipici delle pianure alluvionali, si instaurano sui terrazzi fluviali in posizione arretrata rispetto ai pioppeti dove vi è buona disponibilità di acqua ma raramente vi è ristagno idrico. Tuttavia, in particolare nei tratti terminali dei fiumi in ambito planiziale, durante gli stagionali eventi di piena possono risultare allagati.

I suoli risultano profondi e ricchi di humus.

Riferimenti sintassonomici

Alno glutinosae-Fraxinetum oxycarpae Br.-Bl. 1915 Tchou 1946;
Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae Pedrotti 1970 corr. 1992;
Cladio marisci-Fraxinetum oxycarpae Piccoli, Gerdol & Ferrari ex Brullo & Spampinato 2001;
Fraxino oxycarpae-Populetum canescentis Fascetti 2004;
Lauro nobilis-Fraxinetum oxycarpae I. & V. Kárpáti 1961;
Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae Pedrotti 1970 corr. Pedrotti 1992;
Ranunculo-Fraxinetum oxycarpae Pedrotti et Venanzoni 1994;
Junco acuti-Fraxinetum angustifoliae I & V. Karpáti 1961;
Leucojo aestivi-Fraxinetum oxycarpae Glavac 1959;
Rubio peregrinae-Fraxinetum oxycarpae Biondi & Allegrezza 2004.

Specie guida

Fraxinus angustifolia Vahl subsp. *oxycarpa* (M.Bieb. ex Willd.)
 Franco & Rocha Afonso

dominante e
 codominante

Interesse conservazionistico nazionale

Habitat ad elevata naturalità, localizzato e molto raro lungo i corsi d'acqua e nelle aree palustri della penisola italiana, il suo areale risulta ridotto rispetto alla sua naturale estensione a causa di una forte pressione antropica. L'intervento umano su questi ambienti può essere ricondotto principalmente ad interventi di disboscamento per ottenere nuove aree agricole, bonifiche e canali di drenaggio, modificazioni del regime idrologico dei fiumi a causa di prelievi e sbarramenti lungo il corso d'acqua ed estrazione di ghiaia e sabbia dagli alvei.

A livello europeo l'interesse conservazionistico è contemplato in All.1 della Direttiva 92/43/CEE con l'habitat 92A0, e in All. A della *European Red List of habitats* con l'habitat G1.3, di categoria *Vulnerable*.

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaearctic 2001

=	44.63-Mediterranean riparian ash woods
---	--

EUNIS 2012

=	G1.33-Mediterranean riparian <i>Fraxinus</i> woods
---	--

Direttiva Habitat 92/43/CEE (EUR28)

<	92A0- <i>Salix alba</i> and <i>Populus alba</i> galleries
---	---

Il Manuale Europeo include nell'habitat 92A0 oltre ai populeti ed ai saliceti tutti i boschi ripari mediterranei del 44.6 - *Mediterraneo-Turanian riverine forests* (comprensivi anche dei boschi ripariali a frassino meridionale).

Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

<>	91B0-Frassineti termofili a <i>Fraxinus angustifolia</i>
<>	91E0*-Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)
<>	91F0-Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmion minoris</i>)

Il Manuale Italiano indica che devono essere riferiti:

- all' habitat 91B0 i boschi riconducibili all'associazione *Rubio peregrinae-Fraxinetum oxycarpae* lungo i versanti in corrispondenza di fossi o piccoli corsi d'acqua, sia nei tratti pianeggianti del corso d'acqua e presso la foce;
- All'habitat 91E0* i boschi palustri riconducibili all'associazione *Cladio marisci-Fraxinetum oxycarpae* che si insediano in depressioni interdunali con falda affiorante, svincolate dalle dinamiche fluviali;
- All'habitat 91F0 i boschi riconducibili all'associazione *Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae* che si sviluppano in aree depresse retrodunali o presso la foce dei fiumi e che tendono ad impaludarsi.

European Red List of Habitats 2022

<	G1.3-Mediterranean and Macaronesian riparian woodland	Categoria EU28: <i>Vulnerable</i>	
---	---	-----------------------------------	--

Autori

Scheda: Alberto Cardillo

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco