

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

C.132**Praterie compatte alpine acidofile delle Alpi e dell'Appennino settentrionale**

Ultimo aggiornamento: 15/09/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Praterie mesofile acidofile a copertura continua, presenti in ambito bioclimatico temperato, nei piani subalpino e alpino delle Alpi e, più localmente, dell'Appennino settentrionale.

L'habitat si sviluppa su suoli profondi, derivanti da substrati silicatici o carbonatici ma con suoli acidificati, su pendii ad acclività non accentuata, anche in stazioni semi-pianeggianti con maggiore permanenza di neve.

Questo habitat è caratterizzato dalla presenza di *Nardus stricta* e di altre specie correlate; rispetto alle praterie compatte acidofile del piano montano, attribuite all'habitat C.222, presentano specie tipiche delle quote superiori. I limiti tra queste praterie sono sfumati e in modo sintetico si ritiene di poter limitare i nardeti del piano montano al di sotto del limite del bosco, con qualche dubbio nella fascia di transizione.

L'habitat può avere carattere primario, ma più generalmente si tratta di pascoli; un carico eccessivo di bestiame può alterarne la composizione floristica originaria, causando ingressione di specie tipiche dei pascoli pingui e, nei casi peggiori, l'evoluzione dell'habitat verso quello delle praterie eutrofiche alpine pascolate del *Poion alpinae* (C.135); viceversa la riduzione o l'assenza del pascolo determina la rapida ingressione di specie arbustive e l'evoluzione dell'habitat in brughiera.

Regione Biogeografica

Alpina/Continetale

Macrobioclima

Temperato

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Piano Altitudinale

Subalpino/Alpino

Geoambienti

Versanti con suoli profondi ad acclività medio-bassa, su substrati silicatici o carbonatici ma con suoli acidificati.

Riferimenti sintassonomici

Nardion strictae Br.-Bl. 1926 (classe *Caricetea curvulae* Br.-Bl. 1948).

Specie guida

<i>Nardus stricta</i> L.	dominante	
<i>Ajuga pyramidalis</i> L.		
<i>Alopecurus gerardi</i> Vill.		
<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer subsp. <i>flexuosa</i>		
<i>Botrychium lanceolatum</i> (S.G.Gmel.) Ångstr.		
<i>Botrychium matricariifolium</i> (A.Braun ex Döll) W.D.J.Koch		
<i>Festuca nigricans</i> (Hack.) K.Richt.		
<i>Gentiana acaulis</i> L.		
<i>Geum montanum</i> L.		
<i>Helictochloa praetutiana</i> (Parl. ex Arcang.) Bartolucci, F.Conti, Peruzzi & Banfi subsp. <i>praetutiana</i>		
<i>Hypochaeris uniflora</i> Vill.		
<i>Luzula sudetica</i> (Willd.) Schult.		
<i>Nigritella rhellicani</i> Teppner & E.Klein		
<i>Omalotheca sylvatica</i> (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz		
<i>Potentilla aurea</i> L. subsp. <i>aurea</i>		
<i>Pseudorchis albida</i> (L.) Å.Löve & D.Löve		
<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre subsp. <i>apiifolia</i> (Scop.) Nyman		
<i>Sceptridium multifidum</i> (S.G.Gmel.) M.Nishida ex Tagawa		
<i>Scorzoneroides helvetica</i> (Mérat) Holub		
<i>Trifolium alpinum</i> L.		

Interesse conservazionistico nazionale

Praterie naturali e seminaturali, sensibili ai cambiamenti climatici, in particolare ad innalzamento delle temperature. La ricchezza floristica risulta elevata nel caso di pascolamento regolare e non intensivo. Un eccessivo pascolamento produce una banalizzazione della prateria con aumento di dominanza di nardo; l'alleggerimento del carico di bestiame o addirittura l'abbandono, invece, comporta il passaggio verso altre formazioni prative o di brughiera e regressione dell'habitat.

A livello europeo l'interesse conservazionistico è contemplato in All.1 della Dir. 92/43/CEE, con l'habitat prioritario 6230*.

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaearctic 2001

=	36.31-Alpic mat-grass swards and related communities
---	--

EUNIS 2012

=	E4.31-Alpic <i>Nardus stricta</i> swards and related communities
---	--

Direttiva Habitat 92/43/CEE (EUR28)

<	6230*-Species-rich <i>Nardus</i> grasslands, on siliceous substrates in mountain areas (and submountain areas, in Continental Europe)
---	---

Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

<>	6150-Formazioni erbose boreo-alpine silicicole
<>	6230*-Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)

Nel Manuale italiano e comunità del livello alpino di *Nardion strictae* Br.-Bl. 1926, incluse nell'habitat C.132 di Carta della Natura, ricadono nell'habitat 6150.

L'attribuzione pertanto va valutata caso per caso.

European Red List of Habitats 2022

<	E4.3b-Temperate acidophilous alpine grassland	Categoria EU28: <i>Least Concern</i>	
---	---	--------------------------------------	--

Autori

Scheda: Lucilla Laureti

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco