

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

C.135

Praterie subalpine eutrofiche pascolate delle Alpi

Ultimo aggiornamento: 17/10/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Praterie mesofile pingui, pascolate prevalentemente da bovini, ma anche da altre specie animali, su suoli molto ricchi di nutrienti indifferentemente al tipo di substrato.

Si sviluppano nei piani altimontano e subalpino delle Alpi, nella fascia potenziale di pertinenza di peccete, lariceti, larico-cembrete, rodoreti e mughete, in ambienti freschi, nei pressi di malghe o comunque in aree semipianeggianti o poco acclivi, di facile accesso per il bestiame degli alpeggi.

La copertura erbacea è continua e caratterizzata da un numero di specie non particolarmente elevato. Nelle aree a maggior concentrazione di pascolo, è frequente la presenza di megaforbie nitrofile.

Il mantenimento di queste praterie è legato alla presenza del pascolo, il cui abbandono determina una rapida sostituzione dell'habitat con ingressione di specie arbustive e arboree.

Regione Biogeografica

Alpina

Macrobioclimate

Temperato

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Piano Altitudinale

Montano/Subalpino

Geoambienti

Pianori o pendii montani a bassa acclività con suoli evoluti indipendentemente dal tipo di substrato.

Riferimenti sintassonomici

Poion alpinae Gams ex Oberd. 1950.

Specie guida

<i>Crepis aurea</i> (L.) Cass. subsp. <i>aurea</i>	dominante	
<i>Festuca nigricans</i> (Hack.) K.Richt.	dominante	
<i>Festuca norica</i> (Hack.) K.Richt.	dominante	
<i>Festuca rubra</i> L. subsp. <i>commutata</i> (Gaudin) Markgr.-Dann.	dominante	
<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	dominante	
<i>Mutellina adonidifolia</i> (J.Gay) Gutermann	dominante	
<i>Poa alpina</i> L. subsp. <i>alpina</i>	dominante	
<i>Alchemilla bonae</i> S.E.Fröhner		
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.		
<i>Euphrasia minima</i> Jacq. ex DC.		
<i>Phleum alpinum</i> L.		
<i>Phleum rhaeticum</i> (Humphries) Rauschert		
<i>Plantago alpina</i> L.		
<i>Poa supina</i> Schrad.		
<i>Ranunculus montanus</i> Willd.		
<i>Trifolium badium</i> Schreb.		
<i>Trifolium pratense</i> L. subsp. <i>nivale</i> Ces.		
<i>Trifolium thalii</i> Vill.		
<i>Veronica serpyllifolia</i> L.		

Interesse conservazionistico nazionale

L'habitat se ben gestito e non soggetto a un eccessivo carico di bestiame è funzionale al mantenimento della biodiversità. Inoltre è espressione di un tipico paesaggio alpino pastorale tradizionale ed è in contrazione per abbandono del pascolo.

A livello europeo l'interesse conservazionistico è contemplato in All. A della *European Red List of habitats* con l'habitat E2.1a di categoria *Vulnerable*.

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaearctic 2001

=	36.52-Rough hawkbit pastures
---	------------------------------

EUNIS 2012

=	E4.52-Leontodon hispidus pastures
---	-----------------------------------

European Red List of Habitats 2022

<	E2.1a-Mesic permanent pasture of lowlands and mountains	Categoria EU28: <i>Vulnerable</i>	
---	---	-----------------------------------	--

Autori

Scheda: Lucilla Laureti

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco