

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

C.212

Praterie aride submediterranee a impronta balcanica dell'Italia nord-orientale

Ultimo aggiornamento: 20/10/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Praterie xeriche submediterranee che si sviluppano su substrati carbonatici, dal piano planiziale sino al montano. Generalmente sono praterie discontinue su suoli superficiali, ma possono assumere aspetto relativamente più compatto, localmente su suoli più sviluppati, come terre rosse.

L'habitat ha areale balcanico, esteso fino al margine meridionale prealpino delle Alpi orientali. Queste praterie sono tipiche delle aree carsiche friulane e dei rilievi prealpini fino alla Lombardia orientale; scendono a livello planiziale nei grandi greti dei fiumi caratterizzando i cosiddetti magredi friulani, ove assumono aspetti pionieri e primitivi su alluvioni semistabilizzate, o più evoluti, su alluvioni stabilizzate e terrazzate.

La composizione floristica è generalmente molto ricca, con presenza di specie a gravitazione illirica, specie rare e numerose specie di orchidee.

Si tratta di praterie per lo più secondarie, il cui mantenimento in buono stato è dovuto ad una moderata gestione a pascolo o, nei casi relativamente più mesici, anche a sfalcio.

Regione Biogeografica

Alpina/Continentale

Macrobioclima

Temperato

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Piano Altitudinale

Planiziale/Collinare/Montano

Geoambienti

Pendii collinari a substrato carbonatico; pianori carsici, doline e campi di doline; greti di torrenti, sia su alluvioni sciolte che su alluvioni terrazzate.

Riferimenti sintassonomici

Scorzoneretalia villosae Kovacevic 1959.

Specie guida

<i>Achillea nobilis</i> L.		
<i>Achillea pannonica</i> Scheele		
<i>Asperula purpurea</i> (L.) Ehrend.		
<i>Bromopsis condensata</i> (Hack.) Holub subsp. <i>condensata</i>		
<i>Bromopsis condensata</i> (Hack.) Holub subsp. <i>microtricha</i> (Borbás) Jogan & Bacic		
<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr.		
<i>Carex humilis</i> Leyss.		
<i>Centaurea cristata</i> Bartl.		
<i>Centaurea dichroantha</i> A.Kern.		
<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>angustifolia</i> (DC.) Gremli		
<i>Centaurea rupestris</i> L.		
<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.		
<i>Cirsium pannonicum</i> (L.f.) Link		
<i>Danthonia alpina</i> Vest		
<i>Euphorbia kernerii</i> Huter ex A.Kern.		
<i>Genista sericea</i> Wulfen subsp. <i>sericea</i>		
<i>Gentiana verna</i> L. subsp. <i>tergestina</i> (Beck) Hayek		
<i>Globularia cordifolia</i> L.		
<i>Matthiola fruticulosa</i> (L.) Maire		
<i>Ophrys bertolonii</i> Moretti subsp. <i>benacensis</i> (Reisigl) P.Delforge		
<i>Ophrys sphegodes</i> Mill. subsp. <i>sphegodes</i>		
<i>Orchis mascula</i> (L.) L. subsp. <i>mascula</i>		
<i>Orchis militaris</i> L.		
<i>Polygala forojulensis</i> A.Kern. subsp. <i>carniolica</i> (A.Kern.) Arrigoni		
<i>Pulsatilla montana</i> (Hoppe) Rchb. subsp. <i>montana</i>		
<i>Rhinanthus freynii</i> (Sterneck) Fiori		
<i>Satureja montana</i> L. subsp. <i>variegata</i> (Host) P.W.Ball		
<i>Satureja subspicata</i> Bartl. ex Vis. subsp. <i>liburnica</i> Silic		
<i>Scorzonera villosa</i> Scop. subsp. <i>villosa</i>		
<i>Sesleria juncifolia</i> Wulfen ex Suffren subsp. <i>juncifolia</i>		
<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich.		
<i>Stipa eriocalis</i> Borbás subsp. <i>eriocalis</i>		

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Interesse conservazionistico nazionale

L'habitat in Italia raggiunge l'estremo occidentale del suo areale, centrato nei Balcani; inoltre è ricco dal punto di vista floristico, con presenza di specie a gravitazione illirica, specie rare e numerose specie di orchidee.

Il mantenimento di queste praterie è dovuto ad una moderata gestione a pascolo o, nei casi relativamente più mesici, anche a sfalcio. L'abbandono di queste pratiche provoca un rapido incespugliamento così come un carico intenso di bestiame provoca l'alterazione dell'habitat con specie nitrofile e ruderali. Le varianti dell'habitat presenti nei greti sono soggette a rischio di invasione da parte di specie esotiche, tra le quali ad esempio *Buddleja davidii*, *Reynoutria* sp., *Amorpha fruticosa*.

A livello europeo l'interesse conservazionistico è contemplato in All.1 della Dir. 92/43/CEE con l'Habitat 62A0 e in All.A della *European Red List of Habitats* con l'habitat E1.1j di categoria *Vulnerable*.

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaeartic 2001

<	34.75-Eastern sub-Mediterranean dry grasslands
---	--

EUNIS 2012

<	E1.55-Eastern sub-Mediterranean dry grassland
---	---

Direttiva Habitat 92/43/CEE (EUR28)

<	62A0-Eastern sub-mediterranean dry grasslands (<i>Scorzoneratalia villosae</i>)
---	---

Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

<	62A0-Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (<i>Scorzoneratalia villosae</i>)
---	---

L'habitat 62A0 comprende le formazioni presenti sia in Italia nord-orientale sia in Italia sud-orientale. L'habitat C.212 di Carta della Natura si riferisce solamente alle praterie aride ad impronta balcanica dell'Italia nord-orientale.

European Red List of Habitats 2022

=	E1.1j-Dry steppic, submediterranean pasture of South-Eastern Europe	Categoria EU28: <i>Vulnerable</i>	Categoria EU28+: <i>Near Threatened</i>
---	---	-----------------------------------	---

Autori

Scheda: Lucilla Laureti, Alberto Cardillo

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco