


Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

C.221

Praterie mesofile compatte temperate e submediterranee

Ultimo aggiornamento: 07/10/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Praterie polispecifiche, continue, collinari e montane, da semiaride a mesofile, su suoli relativamente profondi, caratterizzate dalla dominanza di graminacee perenni, tra cui principalmente *Bromopsis erecta* (syn. *Bromus erectus*) e *Brachypodium rupestre*, dalla significativa presenza di orchidee negli aspetti in migliori condizioni ecologiche.

Praterie compatte per lo più secondarie, sono di norma sottoposte a pascolo non intensivo o a sfalci saltuari. L'habitat è in rapporto dinamico con gli arbusteti submediterranei e temperati (D.3), verso cui naturalmente evolve qualora cessi la gestione da parte dell'uomo. Talvolta, possono includere graminacee dei prati pingui, specie infestanti dei coltivi e specie ruderali provenienti dagli habitat attigui o derivanti da precedenti utilizzi da parte dell'uomo.

L'habitat è diffuso in tutta la penisola italiana e nelle isole maggiori, mentre risulta raro e localizzato nelle aree collinari delle Alpi. I mesobrometi si sviluppano nel contesto delle formazioni forestali caducifoglie collinari e montane a dominanza di *Quercus pubescens*, *Quercus cerris*, *Ostrya carpinifolia*, *Castanea sativa* e *Fagus sylvatica*. L'habitat può essere rinvenuto localmente anche al margine delle pianure su terrazzi fluvio-glaciali semiaridi e aperti.

Regione Biogeografica

Alpina/Continentale/Mediterranea

Macrobioclina

Temperato/Mediterraneo

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Piano Altitudinale

Planiziale/Collinare/Montano

Geoambienti

Aree non particolarmente acclivi caratterizzate da suoli asciutti e relativamente profondi instaurati su diversi tipi di substrato.

Riferimenti sintassonomici

Brachypodietalia pinnati Korneck 1974.

Specie guida

<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	dominante e codominante	
<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult.	dominante e codominante	
<i>Briza media</i> L.	dominante e codominante	
<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr. subsp. <i>erecta</i>	dominante e codominante	
<i>Achillea collina</i> (Becker ex Wirtg.) Heimerl		
<i>Anacamptis coriophora</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase		
<i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase		
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.		
<i>Campanula rotundifolia</i> L. subsp. <i>rotundifolia</i>		
<i>Carex caryophyllea</i> Latourr.		
<i>Carlina acaulis</i> L.		
<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>angustifolia</i> (DC.) Greml		
<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>gaudinii</i> (Boiss. & Reut.) Greml		
<i>Cirsium acaulon</i> (L.) Scop. subsp. <i>acaulon</i>		
<i>Dianthus carthusianorum</i> L. subsp. <i>carthusianorum</i>		
<i>Dianthus carthusianorum</i> L. subsp. <i>tenorei</i> (Lacaita) Pignatti		
<i>Gentiana cruciata</i> L. subsp. <i>cruciata</i>		
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i>		
<i>Lathyrus latifolius</i> L.		
<i>Lotus hirsutus</i> L.		
<i>Ononis masquillierii</i> Bertol.		
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i>		
<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All.		
<i>Orchis militaris</i> L.		
<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>		
<i>Rhinanthus angustifolius</i> C.C.Gmel. subsp. <i>angustifolius</i>		
<i>Scabiosa columbaria</i> L. subsp. <i>columbaria</i>		
<i>Trifolium montanum</i> L. subsp. <i>rupestre</i> (Ten.) Nyman		
<i>Veronica barrelieri</i> H.Schott ex Roem. & Schult. subsp. <i>barrelieri</i>		

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Interesse conservazionistico nazionale

Habitat caratterizzato da un'elevata diversità floristica, ricco di specie endemiche e numerose orchidee. Risulta di norma un habitat secondario mantenuto dalle attività agropastorali che, se non risultano eccessive, rendono possibile una elevata biodiversità.

A livello europeo l'interesse conservazionistico è contemplato in All.1 della Direttiva 92/43/CEE con l'habitat 6210*, e in All. A della *European Red List of habitats* con l'habitat E1.2a, di categoria *Vulnerable*.

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaearctic 2001

~	34.32-Sub-Atlantic semidry calcareous grasslands
---	--

Palaearctic limita la categoria dalle Alpi all'Appennino centrale; Carta della Natura ne amplia il significato comprendendo i mesobrometi dell'Italia meridionale.

EUNIS 2012

~	E1.26-Sub-Atlantic semi-dry calcareous grassland
---	--

EUNIS limita la categoria dalle Alpi all'Appennino centrale; Carta della Natura ne amplia il significato comprendendo i mesobrometi dell'Italia meridionale.

Direttiva Habitat 92/43/CEE (EUR28)

<	6210-Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates(<i>Festuco-Brometalia</i>) (* important orchid sites)
---	---

Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

<	6210-Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)
---	---

European Red List of Habitats 2022

=	E1.2a-Semi-dry perennial calcareous grassland	Categoria EU28: <i>Vulnerable</i>
---	---	-----------------------------------

Autori

Scheda: Alberto Cardillo

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco