


Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

C.225

Campi a *Pteridium aquilinum*

Ultimo aggiornamento: 07/10/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Praterie, incolti, brughiere e pascoli mesofili invasivi e dominati da *Pteridium aquilinum*.

Gli pteridieti si sviluppano generalmente nell'orizzonte delle querce caducifoglie e delle faggete; occupano radure e aree aperte, ombreggiate, limitrofe al bosco. La loro propagazione è favorita dal passaggio del fuoco. L'habitat è diffuso su suoli umidi e relativamente profondi, da neutri ad acidi su substrati silicei ma è anche presente su rocce carbonatiche purché gli strati superficiali del suolo risultino decalcificati.

Formazioni quasi sempre fitte e monospecifiche spesso di ridotte dimensioni, al limite dell'unità minima cartografabile, ma talvolta risultano decisamente estese. Sono diffuse su tutto il territorio nazionale dal piano pianiziale al montano. Di norma si rinvencono su aree non particolarmente acclivi, ondulate o pianeggianti. Sono formazioni secondarie, non particolarmente stabili nel tempo, inserite nelle successioni che comportano lo sviluppo di cespuglieti e boscaglie.

Regione Biogeografica

Alpina/Continente/Mediterranea

Macrobioclima

Temperato/Mediterraneo

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Piano Altitudinale

Planiziale/Collinare/Montano

Geoambienti

L'habitat si instaura su suoli relativamente profondi, umidi, da neutri ad acidi, in aree pianeggianti, ondulate o versanti poco acclivi.

Riferimenti sintassonomici

Digitali ferrugineae - *Pteridietum aquilini* Biondi, Biscotti & Casavecchia 2014;
Teucro scorodoniae-*Pteridietum aquilini* Stortelder et Westhoff in Vos et Stortelder 1992;
Pteridio aquilini-Ericetum scoparie Vos et Stortelder (1992) ex Arrigoni 1997;
Pteridio aquilini-Sarothamnetum scoparii Stortelder & Westhoff 1992;
Pteridio aquilini-Tanacetetum siculi Brullo & Marcenò 1985.

Specie guida

<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn subsp. <i>aquilinum</i>	dominante	
--	-----------	--

Interesse conservazionistico nazionale

Habitat naturale favorito dall'abbandono delle pratiche agricole e silvo-pastorali, dal passaggio degli incendi e dal pascolo intensivo, che rendono disponibili allo *Pteridium aquilinum*, di norma confinato lungo l'orlo dei boschi o alle radure, aree più ampie. L'habitat riveste naturalmente un'importante funzione ecotonale come zona di transizione e tensione tra gli habitat forestali e prativi. Infine, va sottolineato, come la presenza dell'habitat sia spesso propedeutica ad un acceleramento del naturale processo evolutivo verso cenosi più stabili e mature.

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaearctic 2001

=	31.863-Supra-Mediterranean bracken fields
---	---

EUNIS 2012

=	E5.33-Supra-Mediterranean <i>Pteridium aquilinum</i> fields
---	---

European Red List of Habitats 2022

=	E5.3- <i>Pteridium aquilinum</i> stand	Categoria EU28: <i>Least Concern</i>	
---	--	--------------------------------------	--

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Autori

Scheda: Alberto Cardillo

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco