


Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

C.312

Praterie mediterranee a terofite acidofile

Ultimo aggiornamento: 20/10/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Prati aridi acidofili effimeri, su suoli poco profondi e poveri di nutrienti, prevalentemente sabbiosi o argillosi, localmente a rocciosità affiorante, soggetti a forte disseccamento estivo. Sono caratterizzati da specie annuali xerofile e termofile con ciclo vegetativo invernale-primaverile.

L'habitat è presente nei territori a bioclimate mediterraneo, dalla fascia costiera a quella collinare, e in Italia meridionale raggiunge sporadicamente il piano montano.

Le terofite che caratterizzano l'habitat appartengono a generi diversi con alcune specie maggiormente caratteristiche come ad esempio: *Tuberaria guttata*, *Silene gallica*, *Plantago bellardi*, *Ornithopus compressus*, *Aira ssp.*.

L'habitat è solitamente frammentato e di piccole dimensioni, localizzato in aree aperte a mosaico con le garighe (D.43) e macchie (D.42) acidofile mediterranee e con le steppe (C.31), pertanto può essere difficile da cartografare.

Gli aspetti riconducibili a questo habitat presenti in ambito dunale sono da riferire alle Dune stabili con vegetazione erbacea (A.322).

Regione Biogeografica

Mediterranea

Macrobioclimate

Mediterraneo

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Piano Altitudinale

Costiero/Planiziale/Collinare

Geoambienti

Superfici planiziali, talora prossime al mare, e versanti collinari, su suoli generalmente superficiali acidi, sabbiosi o argillosi.

Riferimenti sintassonomici

Tuberarietea guttatae Br.-Bl. 1952 em. Rivas-Martínez 1978.

Specie guida

<i>Aira cupaniana</i> Guss.		
<i>Aira tenorei</i> Guss.		
<i>Airopsis tenella</i> (Cav.) Coss. & Durieu		
<i>Briza maxima</i> L.		
<i>Centaureum erythraea</i> Rafn subsp. <i>erythraea</i>		
<i>Cerastium semidecandrum</i> L.		
<i>Corynephorus divaricatus</i> (Pourr.) Breistr.		
<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl.		
<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol.		
<i>Festuca bromoides</i> L.		
<i>Festuca danthonii</i> Asch. & Graebn. subsp. <i>danthonii</i>		
<i>Festuca geniculata</i> (L.) Lag. & Rodr. subsp. <i>geniculata</i>		
<i>Festuca myuros</i> L. subsp. <i>myuros</i>		
<i>Galium divaricatum</i> Lam.		
<i>Helianthemum sanguineum</i> (Lag.) Lag. ex Dunal		
<i>Jasione montana</i> L.		
<i>Linum strictum</i> L.		
<i>Logfia gallica</i> (L.) Cosson & Germ.		
<i>Moenchia erecta</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.		
<i>Molineriella minuta</i> (L.) Rouy		
<i>Ornithopus compressus</i> L.		
<i>Ornithopus pinnatus</i> (Mill.) Druce		
<i>Plantago bellardii</i> All. subsp. <i>bellardii</i>		
<i>Rumex bucephalophorus</i> L. subsp. <i>bucephalophorus</i>		
<i>Silene gallica</i> L.		
<i>Trifolium arvense</i> L. subsp. <i>arvense</i>		
<i>Trifolium cherleri</i> L.		
<i>Trifolium glomeratum</i> L.		
<i>Trifolium scabrum</i> L.		
<i>Trifolium striatum</i> L. subsp. <i>striatum</i>		
<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr.		

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Interesse conservazionistico nazionale

Questo habitat può assumere aspetti di maggiore o minore naturalità con una composizione floristica più o meno ricca. L'habitat occupa superfici di piccole dimensioni e frammentate; può essere disturbato da sovrappascolo, che impoverisce la composizione floristica.

A livello europeo l'interesse conservazionistico è contemplato in All.1 della Dir. 92/43/CEE con l'habitat prioritario 6220* e in All. A della *European Red List of habitats* con l'habitat E1.A - categoria *Vulnerable*.

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaeartic 2001

=	35.3-Mediterranean therophytic siliceous grasslands
---	---

EUNIS 2012

=	E1.81-Mediterranean therophytic siliceous grassland
---	---

Direttiva Habitat 92/43/CEE (EUR28)

<	6220*-Pseudo-steppe with grasses and annuals of the <i>Thero-Brachypodietea</i>
---	---

L'habitat 6220* è riferito al codice Palaeartic 34.5, ma per esso è citata anche la classe *Tuberarietea guttatae* che Carta della Natura riferisce all'habitat C.312.

Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

<	6220*-Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i>
---	---

L'habitat 6220* è riferito al codice Palaeartic 34.5, ma per esso è citata anche la classe *Helianthemetea guttati* che Carta della Natura riferisce all'habitat C.312.

European Red List of Habitats 2022

<	E1.A-Mediterranean to Atlantic open, dry, acid and neutral grassland	Categoria EU28: <i>Vulnerable</i>	Categoria EU28+: <i>Near Threatened</i>
---	--	-----------------------------------	---

Autori

Scheda: Lucilla Laureti, Alberto Cardillo

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco