


Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

C.313

Praterie e garighe invase da *Asphodelus*, *Phlomis*, *Carduus*, *Ferula*

Ultimo aggiornamento: 01/07/2026



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Pascoli in ambienti aridi e soleggiati mediterranei e submediterranei invasi da erbe o arbusti dei generi *Asphodelus*, *Phlomis*, *Carduus*, *Ferula*. L'abbondanza di queste specie è indice di degrado indotto da sovrappascolo, poiché si tratta di specie selezionate, non gradite e scartate dal bestiame, e che per questo diventano dominanti, in sostituzione della flora tipica di garighe e praterie originarie.

L'habitat è presente dalle aree costiere a quelle montane su qualsiasi tipo di substrato, prevalentemente su superfici pianeggianti o poco acclivi. Può trovarsi a mosaico con garighe, macchie aperte e pascoli mediterranei, ma può estendersi anche su ampie aree, pertanto deve essere cartografato quando assume dimensioni che ne consentono l'individuazione come habitat a sé stante.

Regione Biogeografica

Mediterranea

Macrobioclina

Temperato/Mediterraneo

Piano Altitudinale

Costiero/Planiziale/Collinare/Montano

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Geoambienti

Superfici aperte a morfologia pianeggiante o a debole acclività, aride e assolate, su substrati di diversa natura.

Riferimenti sintassonomici

Carthametalia lanati S. Brullo in S. Brullo et Marcenò 1985.

Specie guida

<i>Asphodelus albus</i> Mill. subsp. <i>delphinensis</i> (Gren. & Godr.) Z.Díaz & Valdés		
<i>Asphodelus fistulosus</i> L.		
<i>Asphodelus macrocarpus</i> Parl. subsp. <i>macrocarpus</i>		
<i>Asphodelus ramosus</i> L. subsp. <i>ramosus</i>		
<i>Asphodelus tenuifolius</i> Cav.		
<i>Carduus nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i>		
<i>Carduus pycnocephalus</i> L. subsp. <i>pycnocephalus</i>		
<i>Carlina corymbosa</i> L.		
<i>Carthamus lanatus</i> L.		
<i>Centaurea collina</i> L. subsp. <i>collina</i>		
<i>Dactylis glomerata</i> L. subsp. <i>hispanica</i> (Roth) Nyman		
<i>Ferula glauca</i> L.		
<i>Notobasis syriaca</i> (L.) Cass.		
<i>Onopordum acanthium</i> L. subsp. <i>acanthium</i>		
<i>Onopordum illyricum</i> L. subsp. <i>illyricum</i>		
<i>Phlomis fruticosa</i> L.		
<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.		

Interesse conservazionistico nazionale

Habitat antropogenico, derivato dal degrado dovuto a sovrappascolo di garighe e praterie, con abbondanza di specie non gradite al bestiame in sostituzione della flora originaria, e dunque privo di interesse conservazionistico. L'habitat talvolta può conservare un certo livello di naturalità, anche con presenza di endemiti, in funzione dell'intensità del pascolamento; nel caso di una netta riduzione del bestiame può ricostituirsi, almeno in parte, la flora originaria.

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaeartic 2001

=	32.9-Ermes
---	------------

EUNIS 2012

=	E1.C-Dry mediterranean lands with unpalatable non-vernal herbaceous vegetation
---	--

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Autori

Scheda: Lucilla Laureti, Alberto Cardillo

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco