


Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

C.316**Steppe di alte erbe mediterranee**

Ultimo aggiornamento: 07/10/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Praterie steppiche a dominanza di graminacee cespitose perenni, xerofile mediterranee. Queste formazioni occupano vaste aree nei territori più aridi dell'area mediterranea, sia in ambito costiero che collinare e submontano, su differenti substrati. Sono distinguibili due varianti di questo habitat: la prima caratterizzata dalla presenza di *Lygeum spartum*; la seconda da *Hyparrhenia hirta*.

Lygeum spartum è specie eliofila, xerofila e pioniera, frequente nelle zone calanchive argillose dell'Italia meridionale dove colonizza i versanti, spesso molto acclivi, consolidando le superfici e rallentandone l'erosione superficiale.

Hyparrhenia hirta forma praterie steppiche xero-termofile perenni su differenti substrati, con presenza significativa di suolo sciolto, ben drenato, e raramente su argille. Sono formazioni collinari e submontane della regione biogeografica mediterranea, con clima caldo e arido, pioniere e stabili nelle aree con roccia affiorante o con suoli molto superficiali, ma per lo più secondarie legate alle fasi di ricolonizzazione sia post-incendio della macchia mediterranea e della lecceta, sia post-culturale.

Gli ampelodesmeti puri, largamente diffusi come formazione secondaria nell'Italia centro-meridionale, devono essere riferiti all'habitat *Steppe e garighe a Ampelodesmus mauritanicus* (C.317); mentre situazioni in cui l'ampelodesma si trova a mosaico con altre formazioni steppiche mediterranee, possono essere incluse in questo habitat.

Habitat diffuso principalmente nell'Italia meridionale, Sicilia e Sardegna, presente lungo tutta la costa tirrenica fino alle zone più calde della Liguria.

Regione Biogeografica

Mediterranea

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Macrobioclina

Mediterraneo

Piano Altitudinale

Costiero/Planiziale/Collinare

Geoambienti

Aree costiere e collinari della regione biogeografica mediterranea con clima caldo e prolungata siccità estiva. L'habitat si sviluppa su differenti tipi di substrato. E' presente su suoli argillosi calanchivi, suoli sciolti primitivi e ben drenati, suoli degradati dall'uomo (sovrappascolo o incendi ripetuti), suoli profondi e compatti come ex-coltivi. Si trova sia su versanti anche a forte acclività, sia in aree pianeggianti, come i vecchi terrazzi abbandonati dall'uomo.

Riferimenti sintassonomici

Lygeo sparti-Stipetea tenacissimae Rivas-Mart. 1978.

Specie guida

<i>Andropogon distachyos</i> L.		
<i>Astragalus verrucosus</i> Moris		
<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt.		
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng		
<i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) P.Beauv.		
<i>Convolvulus althaeoides</i> L.		
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill. subsp. <i>piperitum</i> (Ucria) Bég.		
<i>Helictochloa cincinnata</i> (Ten.) Romero Zarco		Sicilia
<i>Hyparrhenia hirta</i> (L.) Stapf subsp. <i>hirta</i>		
<i>Lygeum spartum</i> L.		
<i>Oloptum miliaceum</i> (L.) Röser & H.R.Hamasha		
<i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass.		
<i>Stipa juncea</i> L.		
<i>Stipa letourneuxii</i> Trabut subsp. <i>letourneuxii</i>		Sicilia
<i>Thapsia garganica</i> L. subsp. <i>garganica</i>		
<i>Tricholaena teneriffae</i> (L.f.) Link		Calabria, Sicilia

Interesse conservazionistico nazionale

Habitat ad elevata naturalità nelle sue forme stabili sia in ambito calanchivo che semi rupestre.

A livello europeo l'interesse conservazionistico è contemplato in All.1 della Direttiva 92/43/CEE con l'habitat 6220*.

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaeartic 2001

>	34.62-Esparto steppes
>	34.63-Berceales, feathergrass, diss, andropogonid, fescue steppes

EUNIS 2012

>	E1.42- <i>Lygeum spartum</i> steppes
>	E1.43-Mediterranean steppes dominated by tall grasses other than <i>Stipa tenacissima</i> or <i>Lygeum spartum</i>

Direttiva Habitat 92/43/CEE (EUR28)

<	6220*-Pseudo-steppe with grasses and annuals of the <i>Thero-Brachypodietea</i>
---	---

Nel Manuale Europeo per l'habitat 6220* non vi è uno specifico riferimento all'habitat Palaeartic 34.6 che comprende l'habitat C.316 di Carta della Natura. Tuttavia, nella descrizione dell'habitat, in merito al territorio italiano, viene citata la classe *Lygeo-Stipetea* per gli aspetti perenni termofili di tali comunità vegetali.

Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

<	6220*-Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i>
---	---

European Red List of Habitats 2022

<	E1.3b-Mediterranean tall perennial dry grassland	Categoria EU28: <i>Least Concern</i>	
---	--	--------------------------------------	--

Autori

Scheda: Alberto Cardillo

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco