

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

C.321

Praterie umide mediterranee a alte erbe

Ultimo aggiornamento: 07/10/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Praterie perenni, alte e dense, meso-igrofile, dell'area mediterranea dominate da giunchi, grandi carici e altre alte erbe; possono essere sottoposte a brevi sommersioni stagionali.

L'habitat si rinviene prevalentemente in ambienti interessati da apporti di acqua dolce, pianeggianti e retrodunali, su suoli sabbioso-argillosi umidi o acquitrinosi, dove può formare ampi appezzamenti talvolta pascolati, mai intensamente. Più raramente tali formazioni si rivengono lungo i corsi d'acqua o le aree umide interne.

Laddove il disturbo da pascolo è maggiore, le specie guida sono scarse o assenti ed il suolo risulta particolarmente ricco in nutrienti, l'ecotopo va riferito all'habitat *Praterie umide mediterranee eutrofiche pascolate* (C.322).

Vengono incluse in questo habitat anche le più rare praterie con specie mediterranee di taglia inferiore (*Gaudinio fragilis-Hordeion bulbos*).

Tali praterie si possono riscontrare anche nel bioclina temperato in prossimità della costa, come avviene nell'alto Adriatico, dove l'azione mitigatrice del mare crea condizioni locali tali da supportarne la presenza.

Regione Biogeografica

Continentale/Mediterranea

Macrobioclina

Temperato/Mediterraneo

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Piano Altitudinale

Costiero/Planiziale

Geoambienti

Ambienti pianeggianti meso-igrofilo, retro dunali o al margine di aree umide interne, con suoli ricchi di sabbioso-argillosi, umidi o acquitrinosi. La falda acquifera di acqua dolce risulta sempre molto superficiale sebbene sottoposta a fluttuazioni stagionali.

Riferimenti sintassonomici

Holoschoenetalia vulgaris Braun-Blanq. ex Tchou 1948.

Specie guida

<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase		
<i>Briza minor</i> L.		
<i>Carex mairei</i> Coss. & Germ.		Liguria
<i>Centaurium littorale</i> (Turner) Gilmour subsp. <i>littorale</i>		
<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce subsp. <i>pulchellum</i>		
<i>Cirsium monspessulanum</i> (L.) Hill		
<i>Cyperus badius</i> Desf.		
<i>Deschampsia media</i> (Gouan) Roem. & Schult. subsp. <i>media</i>		
<i>Eupatorium cannabinum</i> L. subsp. <i>cannabinum</i>		
<i>Galium palustre</i> L. subsp. <i>elongatum</i> (C.Presl) Lange		
<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.		
<i>Hypericum tomentosum</i> L.		
<i>Juncus conglomeratus</i> L.		
<i>Juncus inflexus</i> L. subsp. <i>inflexus</i>		
<i>Lotus maritimus</i> L.		
<i>Lotus rectus</i> L.		
<i>Mentha longifolia</i> (L.) L.		
<i>Molinia arundinacea</i> Schrank		
<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel.		
<i>Prunella hyssopifolia</i> L.		Liguria
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.		
<i>Schoenus nigricans</i> L.		
<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják		
<i>Serapias vomeracea</i> (Burm.f.) Briq.		
<i>Trifolium lappaceum</i> L.		
<i>Trifolium resupinatum</i> L.		

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Interesse conservazionistico nazionale

Habitat ad elevata naturalità e diversità floristica se mantenuto in condizioni di equilibrio ottimali; una non corretta gestione degli ambienti può comportarne la scomparsa a causa del sovrapascolo o, al contrario, possono instaurarsi processi evolutivi verso ambiti preforestali (saliceti, pioppeti). Storicamente l'habitat ha avuto un ruolo importante come pascolo estivo ovino e bovino in aree in cui i pascoli di norma si seccano; il cambiamento della gestione zootecnica, con allevamenti intensivi concentrati in stalla, ha generato la scomparsa nell'ultimo secolo di questi ambienti su vaste aree con conseguente trasformazione delle aree in seminativo o altre praterie di degradazione.

A livello europeo l'interesse conservazionistico è contemplato in All.1 della Direttiva 92/43/CEE con l'habitat 6420.

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaeartic 2001

>	37.4-Mediterranean tall humid grasslands
>	37.5-Mediterranean short humid grasslands

Nell'habitat C.321 di Carta della Natura vengono incluse anche le rare praterie a *Deschampsia media*, localizzate in Toscana, che in Palaeartic sono classificate con la categoria 37.5.

EUNIS 2012

>	E3.1-Mediterranean tall humid grassland
>	E3.2-Mediterranean short humid grassland

Nell'habitat C.321 di Carta della Natura vengono incluse anche le rare praterie a *Deschampsia media*, localizzate in Toscana, che in EUNIS sono classificate con la categoria E3.2.

Direttiva Habitat 92/43/CEE (EUR28)

~	6420-Mediterranean tall humid herb grasslands of the <i>Molinio-Holoschoenion</i>
---	---

Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

~	6420-Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>
---	---

European Red List of Habitats 2022

~	E3.1a-Mediterranean tall humid inland grassland	Categoria EU28: <i>Least Concern</i>	
---	---	--------------------------------------	--

Autori

Scheda: Alberto Cardillo

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco