

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

C.322

Praterie umide mediterranee eutrofiche pascolate

Ultimo aggiornamento: 07/10/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Prati eutrofici abitualmente utilizzati dal bestiame, su suoli stagionalmente inondati, diffusi nella fascia costiera e pianiziale dell'Italia mediterranea.

Pascoli intensamente fertilizzati, utilizzati in particolare dalle bufale, di norma posizionati in ambito retrodunale o nelle pianure alluvionali dei grandi fiumi. Risultano umidi dall'autunno alla primavera e spesso rimangono parzialmente sommersi dalle acque. Durante il periodo estivo il suolo può diventare secco.

In ambito costiero possono essere interessati da ingressioni di acqua salmastra e dalla risalita del cuneo salino, con conseguente comparsa di vegetazione annuale alofila. Nelle aree soggette a calpestio frequente degli animali si verifica la rottura della cotica erbosa con affioramento del suolo nudo, che, favorisce l'evaporazione, e aumenta la concentrazione salina.

L'habitat è particolarmente diffuso lungo la fascia costiera bassa e sabbiosa della costa tirrenica centrale e nelle pianure alluvionali limitrofe.

Regione Biogeografica

Mediterranea

Macrobioclima

Mediterraneo

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Piano Altitudinale

Costiero/Planiziale

Geoambienti

Ambienti di pianura alluvionale o retrodunale su suoli tendenzialmente argillosi e limosi con ristagni di acqua che talvolta può risultare salmastra.

Riferimenti sintassonomici

Trifolium maritimi Br.-Bl. ex Br.-Bl. et al. 1952.

Specie guida

<i>Agrostis stolonifera</i> L. subsp. <i>stolonifera</i>		
<i>Alopecurus geniculatus</i> L.		
<i>Bromus racemosus</i> L. subsp. <i>racemosus</i>		
<i>Carduus personata</i> (L.) Jacq. subsp. <i>personata</i>		
<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L.		
<i>Cirsium alsophilum</i> (Pollini) Soldano		
<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.		
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.		
<i>Elymus repens</i> (L.) Gould subsp. <i>repens</i>		
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.		
<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.		
<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub		
<i>Holcus lanatus</i> L. subsp. <i>lanatus</i>		
<i>Juncus effusus</i> L. subsp. <i>effusus</i>		
<i>Juncus filiformis</i> L.		
<i>Lolium arundinaceum</i> (Schreb.) Darbysh. subsp. <i>arundinaceum</i>		
<i>Lolium pratense</i> (Huds.) Darbysh.		
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.		
<i>Lychnis flos-cuculi</i> L. subsp. <i>flos-cuculi</i>		
<i>Rumex crispus</i> L.		

Interesse conservazionistico nazionale

Habitat antropogenico di basso interesse conservazionistico intrinseco, possono tuttavia rappresentare importanti *stepping stones* per uccelli migratori legati agli ambienti umidi e salmastri.

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaearctic 2001

<	37.5-Mediterranean short humid grasslands
---	---

EUNIS 2012

<	E3.2-Mediterranean short humid grassland
---	--

European Red List of Habitats 2022

<>	E3.2a-Mediterranean short moist grassland of lowlands	Categoria EU28: <i>Least Concern</i>	
----	---	--------------------------------------	--

Autori

Scheda: Alberto Cardillo

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco