

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

C.511 Praterie subnitrofile

Ultimo aggiornamento: 07/10/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Prati sinantropici, eterogenei e polispecifici, che formano stadi pionieri, anche molto estesi, su suoli ricchi di nutrienti influenzati da passate pratiche agronomiche o pascolo intensivo.

Questi prati, tipicamente post-colturali hanno una composizione molto variegata, ma normalmente non particolarmente complessa, formata da specie pioniere, ruderali, nitrofile, infestanti delle colture o precedentemente coltivate in loco o attualmente nei territori circostanti.

Habitat diffuso principalmente nel piano planiziale e collinare, a stretto contatto con le aree agricole. Si tratta di formazioni ruderali piuttosto che di veri e propri prati pascolo.

Regione Biogeografica

Alpina/Continentale/Mediterranea

Macrobioclimate

Temperato/Mediterraneo

Piano Altitudinale

Costiero/Planiziale/Collinare

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Geoambienti

Aree pianeggianti e collinari di norma non particolarmente acclivi.

Riferimenti sintassonomici

Brometalia rubenti-tectorum Rivas-Martinez et Izco 1977.

Specie guida

<i>Anchusa undulata</i> L. subsp. <i>hybrida</i> (Ten.) Bég.		
<i>Anisantha diandra</i> (Roth) Tutin ex Tzvelev		
<i>Anisantha fasciculata</i> (C.Presl) Nevski subsp. <i>fasciculata</i>		
<i>Anisantha madritensis</i> (L.) Nevski subsp. <i>madritensis</i>		
<i>Anisantha rubens</i> (L.) Nevski		
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link		
<i>Calendula arvensis</i> (Vaill.) L.		
<i>Crepis neglecta</i> L. subsp. <i>neglecta</i>		
<i>Dactylis glomerata</i> L. subsp. <i>glomerata</i>		
<i>Dasypyrum villosum</i> (L.) P.Candargy		
<i>Echium italicum</i> L. subsp. <i>italicum</i>		
<i>Echium plantagineum</i> L.		
<i>Festuca bromoides</i> L.		
<i>Festuca danthonii</i> Asch. & Graebn. subsp. <i>danthonii</i>		
<i>Festuca ligustica</i> (All.) Bertol.		
<i>Galactites tomentosus</i> Moench		
<i>Hordeum murinum</i> L. subsp. <i>leporinum</i> (Link) Arcang.		
<i>Hordeum murinum</i> L. subsp. <i>murinum</i>		
<i>Lolium rigidum</i> Gaudin subsp. <i>rigidum</i>		
<i>Lotus ornithopodioides</i> L.		
<i>Lupinus angustifolius</i> L.		
<i>Medicago polymorpha</i> L.		
<i>Phalaris brachystachys</i> Link		
<i>Urospermum picroides</i> (L.) Scop. ex F.W.Schmidt		
<i>Valerianella costata</i> (Stev.) Betcke		
<i>Valerianella eriocarpa</i> Desv.		
<i>Vicia hybrida</i> L.		

Interesse conservazionistico nazionale

Habitat sinantropico dovuto ad un recente abbandono di pratiche agricole o pastorali, risulta ancora dominato da specie ruderali, nitrofile e infestanti delle colture. Tuttavia, tali formazioni rappresentano spesso un rifugio per la fauna in ambiti fortemente antropizzati e la sua naturale evoluzione comporta la ricostituzione di habitat naturali quali praterie o arbusteti.

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaearctic 2001

>	34.8-Mediterranean subnitrophilous grasslands
---	---

Palaearctic circoscrive questa categoria alla regione biogeografica mediterranea mentre per Carta della Natura tale habitat ha un'estensione più ampia comprendendo anche le formazioni post-colturali dell'area temperata.

EUNIS 2012

<	E1.6-Subnitrophilous annual grassland
<	I1.5-Bare tilled, fallow or recently abandoned arable land

Autori

Scheda: Alberto Cardillo

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco