


Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

D.132**Lande oromediterranee a arbusti spinosi dell'Appennino centrale e meridionale e delle Madonie**

Ultimo aggiornamento: 02/02/2026



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Habitat caratterizzato da arbusti bassi, spinosi e pulviniformi, a struttura aperta, presente nei piani montano e subalpino di aree a macrobioclima temperato dell'Appennino centrale e meridionale, ed in Sicilia sui Monti Nebrodi e Madonie.

Si sviluppa nelle porzioni sommitali delle montagne, in zone fredde e ventose, su suoli primitivi e su diversi tipi di substrato, sia di natura carbonatica sia silicatica. Localmente può scendere fino alla fascia al limite dei boschi ed occupare radure.

L'habitat è prevalentemente costituito da camefite e altre specie endemiche, soprattutto dei generi *Astragalus* e *Genista*, differenziali e distinte su base geografica: *Astragalus nebrodensis* e *Genista cupanii* in Sicilia su Nebrodi e Madonie; *Astragalus parnassi* subsp. *Calabricus* e *Cytisus spinescens* in Calabria sulla Sila; *Genista sericea* in Appennino lucano; *Genista michelii* in Appennino marchigiano e Gargano.

Si tratta per lo più di formazioni pioniere, adattate a resistere in condizioni microclimatiche ed edafiche limitanti per altre comunità. Nelle porzioni inferiori, più localmente, possono derivare da forme di degrado della vegetazione forestale.

L'habitat ha una distribuzione frammentaria lungo le montagne appenniniche; generalmente presente su superfici di ridotte dimensioni e spesso a mosaico con praterie xeriche e discontinue nelle porzioni sommitali delle montagne dell'Italia centrale e meridionale (C.215 e C.122).

Regione Biogeografica

Mediterranea

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Macrobioclina

Temperato

Piano Altitudinale

Montano/Subalpino

Geoambienti

Versanti, vette e crinali delle porzioni sommitali delle montagne mediterranee, in aree esposte a forte vento, su diversi tipi di substrati, sia di natura carbonatica, sia silicatica e suoli aridi e primitivi.

Riferimenti sintassonomici

Astragaletum nebrodensis Pignatti et Nimis 1980;
Genistetum cupanii Pignatti et Nimis 1980;
Chamaecytiso spinescentis-Genistetum michelii De Faveri et Nimis ex Biondi 1997;
Pimpinello lithophilae-Astragaletum sirinici Biondi et Blasi 1982;
Astragaletum calabrici Giacomini et Gentile 1966;
Phleo ambigu-Bromion erecti Biondi & Blasi ex Biondi, Ballelli, Allegrezza, Zuccarello 1995.

Specie guida

<i>Allium cupanii</i> Raf.		
<i>Anthemis cretica</i> L. subsp. <i>calabrica</i> (Arcang.) R.Fern.		
<i>Armeria brutia</i> Brullo, Gangale & Uzunov		
<i>Astragalus nebrodensis</i> (Guss.) Strobl		
<i>Astragalus parnassi</i> Boiss. subsp. <i>calabricus</i> (Fisch.) Maassoumi		
<i>Astragalus sirinicus</i> Ten.		
<i>Centaurea sarfattiana</i> Brullo, Gangale & Uzunov		
<i>Cytisus spinescens</i> C.Presl		
<i>Dianthus sicalus</i> C.Presl		
<i>Genista cupanii</i> Guss.		
<i>Genista michelii</i> Spach		
<i>Genista sericea</i> Wulfen subsp. <i>pollinensis</i> F.Conti, Feoli Chiapella & Bernardo		
<i>Satureja cuneifolia</i> Ten.		

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Interesse conservazionistico nazionale

Habitat ad elevata naturalità, con numerose specie endemiche e rare.

Nelle porzioni sommitali delle montagne l'habitat è espressione di formazioni pioniere, adattate a resistere in condizioni microclimatiche ed edafiche limitanti per altre comunità; nelle porzioni inferiori, più localmente, può derivare da forme di degrado della vegetazione forestale ad esempio a seguito di disboscamento o pascolo.

Presenta una distribuzione estremamente frammentata lungo l'Appennino ed occupa generalmente superfici di ridotte dimensioni.

Per il mantenimento dell'habitat è ottimale una gestione tramite una forma di pastorizia tradizionale non intensiva.

A livello europeo l'Interesse conservazionistico è contemplato, in All.1 della Dir. 92/43/CEE con l'habitat 4090.

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaeartic 2001

=	31.77-Madonie and Apennine hedgehog-heaths
---	--

EUNIS 2012

=	F7.47-Madonie and Apennine hedgehog-heaths
---	--

Direttiva Habitat 92/43/CEE (EUR28)

<	4090-Endemic oro-Mediterranean heaths with gorse
---	--

Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

<	4090-Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose
---	--

European Red List of Habitats 2022

<	F7.4b-Central Mediterranean mountain hedgehog-heath	Categoria EU28: <i>Least Concern</i>	
---	---	--------------------------------------	--

Autori

Scheda: Lucilla Laureti

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco