


Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

D.321

Ginepreti collinari e montani

Ultimo aggiornamento: 26/06/2026



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Cespuglieti più o meno aperti, temperati e submediterranei con dominanza di ginepri (*Juniperus communis*, *Juniperus oxycedrus* e *Juniperus phoenicea*).

Specie poliedrica, *Juniperus communis* si rinviene dalla costa, riferito alle *Dune stabili a ginepri* (A.324), all'ambito subalpino in forma prostrata, incluso nelle *Lande a ginepri prostrati* (D.113). I Ginepreti collinari e montani evidenziano unicamente le formazioni arbustive submediterranee, collinari e montane, in cenosi da mesoxeriche a xeriche, sia primarie che secondarie, più frequenti su substrati calcarei e flyshoidi, con suoli da poco sviluppati a profondi, ampiamente diffuse in tutto l'Appennino, poco frequenti in Italia settentrionale, Sardegna e Sicilia. Di norma si tratta di popolamenti monospecifici o paucispecifici, secondari, inizialmente aperti su pascoli, sfalci o ex-coltivi con uno strato erbaceo caratterizzato da specie dei *Festuco-Brometea*; nel tempo, con una diminuzione del pascolamento, tali formazioni tendono a infittirsi e a evolvere verso querceti o faggete. Il ginepro comune a volte costituisce formazioni in codominanza o in cui risulta minoritario rispetto ad altri arbusti a caducifoglie dei *Prunetalia*, in questi casi deve essere riferito all'habitat più generico *Cespuglieti temperati a latifoglie decidue* (D.311). Meno diffuse risultano le formazioni primarie che si sviluppano sia su suoli primitivi con elevata presenza di scheletro, in condizioni xeriche, in prossimità di aree rupestri, detritiche o ad erosione accelerata, sia su paleosuoli in cui *Juniperus communis* accompagna *Calluna vulgaris* in brughiere aperte in cui localmente può diventare dominante.

Juniperus oxycedrus, specie più xerofila e termofila, in ambito submediterraneo risulta localizzato e sporadico lungo la penisola, si sviluppa su suoli da neutri ad acidi, poco strutturati o rocciosi, nel piano collinare o basso montano, sia invadendo praterie aride (xerobrometi) sia formando garighe aperte stabili nel tempo. In aree più spiccatamente mediterranee può consociarsi con altre specie della macchia a sclerofille oppure spiccare su di essa con individui arborescenti; in questi casi l'ecotopo deve essere riferito agli habitat *Macchia mediterranea* (D.421) o *Matorral a ginepri* (D.413) a seconda della struttura della formazione. Anche il ginepro rosso può formare popolamenti su duna, in questo caso l'habitat deve essere riferito alla categoria *Dune stabili a ginepri* (A.324).

Juniperus phoenicea forma popolamenti radi e localizzati, per lo più su versanti meridionali, rupi o accumuli detritici calcarei, accompagnati da un corteggio floristico ricco di casmofite. Sono formazioni tipicamente xero-termofile presenti sulle Alpi Liguri, tra Piemonte e Liguria, e sulle Alpi Apuane in Toscana.

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Regione Biogeografica

Alpina/Continentale/Mediterranea

Macrobioclimate

Temperato/Mediterraneo

Piano Altitudinale

Collinare/Montano

Geoambienti

I gineprei si sviluppano su versanti a diverse acclività, crinali e pianori, sia su cotiche erbose continue con suoli più o meno profondi e assenza di ristagno di acqua, sia su praterie discontinue o garighe con elevata aridità estiva e con roccia affiorante.

Riferimenti sintassonomici

Frangulo rupestris-Juniperetum communis Poldini et Vidali 2002;
Junipero communis-Pyracanthetum coccineae Biondi, Allegrezza e Gujtian. 1988;
Rhamno cathartici-Juniperetum communis Poldini et Vidali 2002;
Viburno lantanae-Juniperetum communis Cutini, Stanisci et Pirone 2002.

Specie guida

<i>Juniperus communis</i> L.	dominante	
<i>Juniperus oxycedrus</i> L.	dominante	
<i>Juniperus phoenicea</i> L.	dominante	

Interesse conservazionistico nazionale

Habitat naturale, primario o secondario, la cui diffusione risulta attualmente in espansione a causa dell'abbandono dei pascoli. Può rappresentare un habitat rifugio per la fauna anche in contesti alterati quali zone agricole o aree antropizzate.

Fanno eccezione le formazioni a *Juniperus phoenicea*, rare, localizzate e disgiunte relitti di fase climatiche più calde attualmente circoscritte a particolari stazioni rifugio, di grande interesse conservazionistico.

A livello europeo l'interesse conservazionistico è contemplato in All.1 della Direttiva 92/43/CEE con l'habitat 5130.

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaearctic 2001

>	31.88-Common juniper scrub
---	----------------------------

Palaearctic con l'habitat 31.88 considera solo le formazioni a *Juniperus communis*, Carta della Natura con l'habitat D.321 include anche quelle submediterranee a *Juniperus oxycedrus* e *Juniperus Phoenicea*.

EUNIS 2012

>	F3.16- <i>Juniperus communis</i> scrub
---	--

EUNIS con l'habitat F3.16 considera solo le formazioni a *Juniperus communis*, Carta della Natura con l'habitat D.321 include anche quelle submediterranee a *Juniperus oxycedrus* e *Juniperus Phoenicea*.

Direttiva Habitat 92/43/CEE (EUR28)

>	5130- <i>Juniperus communis</i> formations on heaths or calcareous grasslands
---	---

Il Manuale europeo con l'habitat 5130 considera solo le formazioni a *Juniperus communis*, Carta della Natura con l'habitat D.321 include anche quelle submediterranee a *Juniperus oxycedrus* e *Juniperus Phoenicea*.

Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

>	5130-Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli
---	--

Il Manuale Italiano con l'habitat 5130 considera solo le formazioni a *Juniperus communis*, Carta della Natura con l'habitat D.321 include anche quelle submediterranee a *Juniperus oxycedrus* e *Juniperus Phoenicea*.

European Red List of Habitats 2022

>	F3.1a-Lowland to montane temperate and submediterranean <i>Juniperus</i> scrub	Categoria EU28: <i>Least Concern</i>	
---	--	--------------------------------------	--

La Red List con l'habitat F3.1a considera solo le formazioni a *Juniperus communis*, Carta della Natura con l'habitat D.321 include anche quelle submediterranee a *Juniperus oxycedrus* e *Juniperus Phoenicea*.

Autori

Scheda: Alberto Cardillo

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco