


Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

D.331

Ginestretri collinari e montani

Ultimo aggiornamento: 10/11/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Ginestretri collinari e montani a *Cytisus scoparius*, *Cytisophyllum sessilifolium* e *Adenocarpus complicatus*; sono cenosi da mesofile a xerofile, da mesoneutrofile a debolmente acidofile. Queste ginestre di norma si rinvergono nel sottobosco dei querceti misti a caducifoglie nella fascia submediterranea, ma possono formare popolamenti più o meno estesi lungo i loro margini oppure invadere prati e pascoli abbandonati limitrofi al bosco o aree disboscate.

Si tratta di norma di formazioni secondarie, stadi di una riforestazione in atto con possibile evoluzione verso i querceti a caducifoglie o verso la faggeta. Occasionalmente possono formare popolamenti anche sopra l'orizzonte silvatico su pendii mediamente scoscesi ed esposizioni soleggiate meridionali.

Questo habitat dal punto di vista fisionomico mostra analogie con i *Ginestretri a Spartium junceum* (D.332), con la differenza che predilige condizioni di maggiore mesofilia e meno disturbate.

L'habitat è diffuso lungo tutta la penisola italiana, in Sicilia e Sardegna, mentre risulta molto localizzato in Italia settentrionale. Normalmente non occupa mai estensioni notevoli e spesso crea formazioni lineariformi, di conseguenza viene cartografato solo laddove assume dimensioni significative.

Regione Biogeografica

Alpina/Continente/Mediterranea

Macrobioclimate

Temperato/Mediterraneo

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Piano Altitudinale

Collinare/Montano

Geoambienti

Pendii, versanti, crinali collinari e montani con suoli sviluppati e assenza di ristagno idrico, localmente anche in aree pianeggianti.

Riferimenti sintassonomici

Adenocarpus complicatus-*Cytisetum scoparii* Blasi, Cavaliere, Abbate, Scoppola 1990;
Pteridio aquilini-*Sarothamnetum scoparii* Stortelder & Westhoff 1992;
Centaureo-Adenocarpum brutii Brullo et Furnari in Barbagallo et al. 1982;
Cytisus sessilifolius-*Prunetum mahaleb* Pedrotti 1994;
Cytisus sessilifolius-*Crataegum laevigatae* Catorci et Orsomando 1999;
Cytisus sessilifolius-*Coriarietum myrtifoliae* Biondi, Vagge, Baldoni, Taffetani 1997;
Spartium junceum-*Cytisetum sessilifolius* Biondi, Allegrezza & Guitian 1988 (aspetti a dominanza di *Cytisophyllum sessilifolium*).

Specie guida

<i>Adenocarpus complicatus</i> (L.) J.Gay subsp. <i>brutius</i> (Brullo, De Marco & Siracusa) Peruzzi & Bernardo		
<i>Adenocarpus complicatus</i> (L.) J.Gay subsp. <i>commutatus</i> (Guss.) Cout.		
<i>Cytisophyllum sessilifolium</i> (L.) O.Lang		
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link subsp. <i>scoparius</i>		
<i>Cytisus villosus</i> Pourr.		

Interesse conservazionistico nazionale

Habitat generalmente di ridotte dimensioni e marginale in contesti ambientali di maggiore naturalità, è espanso dall'attività dell'uomo attraverso l'abbandono di aree agricole e pascoli, quale stadio intermedio nella riforestazione di tali aree. Habitat importante per gli insetti impollinatori.

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaeartic 2001

=	31.844-Tyrrhenian broom fields
---	--------------------------------

EUNIS 2012

=	F3.26-Tyrrhenian broom fields
---	-------------------------------

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

European Red List of Habitats 2022

<	F3.1c-Lowland to montane temperate and submediterranean genistoid scrub	Categoria EU28: <i>Least Concern</i>	
---	---	--------------------------------------	--

Autori

Scheda: Alberto Cardillo, Roberto Bagnaia

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco