


Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

D.332

Ginestreti a *Spartium junceum*

Ultimo aggiornamento: 10/11/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Cespuglieti dominati da *Spartium junceum*. Habitat a carattere pioniero ed invasivo, che tende a costituire formazioni chiuse monospecifiche. Si rinviene spesso in aree rurali, dove colonizza coltivi, sfalci e pascoli abbandonati, ed in aree soggette a incendio o a forte dinamismo geo-idrologico, come pendii ad erosione accelerata o in frana. Costituisce inoltre formazioni di mantello nella fascia delle querce caducifoglie con penetrazioni in quella delle foreste a sempreverdi. Lo *Spartium junceum* colonizza prevalentemente suoli superficiali, relativamente aridi, spesso detritici, sabbiosi o rocciosi, sia su substrati carbonatici che silicatici.

Habitat molto diffuso in tutta l'Italia peninsulare e insulare, con areale che, seppur centrato in ambito mediterraneo, presenta estensioni significative verso nord, ed occupa tutti i piani altitudinali dal costiero e planiziale fino al montano, con massimo sviluppo nel piano collinare.

Questo habitat dal punto di vista fisionomico mostra analogie con i *Ginestreti collinari e montani* (D.331), con la differenza che predilige condizioni di minore mesofilia e più disturbate.

Lo *Spartium junceum* si accompagna spesso ad altre piante pioniere, come *Ampelodesmus mauritanicus*, *Rubus ulmifolius*, *Prunus spinosa*, altre ginestre, ginepri, elementi della macchia mediterranea. Con queste specie, per ciascuna delle quali è previsto un habitat specifico, può formare consorzi misti che vengono attribuiti ad un habitat o all'altro a seconda della dominanza e del contesto ecologico.

Regione Biogeografica

Alpina/Continentale/Mediterranea

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Macrobioclina

Temperato/Mediterraneo

Piano Altitudinale

Costiero/Planiziale/Collinare/Montano

Geoambienti

Pendii, versanti, crinali collinari e montani ed aree pianeggianti. Questo habitat predilige esposizioni soleggiate ed è diffuso prevalentemente su suoli poveri, su substrati di varia litologia, sia carbonatici che silicatici.

Riferimenti sintassonomici

Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii Biondi, Allegrezza & Guitian 1988;

Spartio juncei-Phillyretum angustifoliae Vagge et Biondi 1999;

Spartio juncei-Bupleuretum fruticosi Raimondo & Ilardi 2009.

Specie guida

<i>Spartium junceum</i> L.	dominante	
----------------------------	-----------	--

Interesse conservazionistico nazionale

Habitat molto diffuso in Italia, con estrema capacità di propagazione ed attualmente in fase di espansione a causa della riduzione delle attività agricole, di pascolo e di sfalcio; si insedia rapidamente anche in aree incendiate, disboscate, e soggette ad erosione e frana. Pertanto non è fragile né tantomeno a rischio. Tuttavia è un habitat ad elevata naturalità e importante per il consolidamento dei versanti e come tappa delle serie di vegetazione verso comunità più complesse e stabili. Nei consorzi più fitti rappresentano un habitat di rifugio per la fauna anche in ambienti fortemente antropizzati.

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaeartic 2001

=	32.A-Spanish-broom fields
---	---------------------------

EUNIS 2012

=	F5.4- <i>Spartium junceum</i> fields
---	--------------------------------------

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Autori

Scheda: Roberto Bagnaia

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco