


Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

D.423**Macchia a *Cytisus laniger*, *Cytisus spinosus*, *Cytisus infestus***

Ultimo aggiornamento: 05/11/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Macchie caratterizzate dalla presenza dominante di alcune specie del genere *Cytisus*, tra le quali *Cytisus laniger*, *Cytisus spinosus*, *Cytisus infestus* subs. *infestus*, cui si possono accompagnare altre specie accessorie arbustive delle macchie termofile, come i cisti, il lentisco e la fillirea.

Si tratta di un habitat a carattere xerico ed eliofilo, che spesso assume la struttura di una macchia fitta, impenetrabile e spinosa, presente in ambito costiero su substrati sabbiosi, o collinare su pendii rocciosi e aridi, su suoli generalmente sciolti e ben drenati indifferentemente al tipo di substrato, ma con preferenza per i litotipi silicatici.

L'habitat è diffuso nella fascia termomediterranea, presente nelle porzioni più calde peninsulari, Sardegna e Sicilia comprese, dove si spinge all'interno e più in alto in aree molto aride.

Queste formazioni sono di origine secondaria, favorite e sviluppate a seguito di incendi; rappresentano stadi di ricolonizzazione e ricostituzione della vegetazione originaria, generalmente di boschi termofili; spesso formano mosaici con altri tipi di macchie mediterranee ed hanno una distribuzione frammentaria, pertanto sono cartografate dove assumono dimensioni significative.

Regione Biogeografica

Mediterranea

Macrobioclimate

Mediterraneo

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Piano Altitudinale

Costiero/Planiziale/Collinare

Geoambienti

Pendii da costieri a collinari su diversi substrati, preferibilmente silicatici, suoli superficiali, xerici e ben drenati.

Riferimenti sintassonomici

Oleo sylvestris-Calicotometum infestae Biondi & Guerra 2008;

Pistacio lentisci-Calicotometum villosae Biondi, Filigheddu et Farris 2001;

Pyro amygdaliformis-Calicotometum infestae Brullo, Gianguzzi, La Mantia, Siracusa 2008.

Specie guida

Cytisus infestus (C.Presl) Guss. subsp. *infestus*
Cytisus laniger DC.

Cytisus spinosus (L.) Lam.

Interesse conservazionistico nazionale

L'habitat ha carattere pioniero e svolge un ruolo di ricostituzione vegetale soprattutto a seguito di incendi; in prossimità di contesti antropizzati può essere minacciato da varie forme di pressioni.

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaeartic 2001

= 32.215-*Calicotome* brush

EUNIS 2012

= F5.515-*Calicotome* brush

European Red List of Habitats 2022

< F7.1-Western Mediterranean spiny heath

Categoria EU28: *Least Concern*

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Autori

Scheda: Lucilla Laureti

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco