


Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

D.427

Macchia con *Chamaerops humilis*

Ultimo aggiornamento: 14/11/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Macchie termoxerofile caratterizzate dalla presenza della palma nana (*Chamaerops humilis*), dominante o codominante, con altri arbusti della flora termomediterranea, tra cui *Juniperus turbinata*, *Pistacia lentiscus*, *Poterium spinosum*, *Olea europaea*, *Quercus coccifera*, *Quercus ilex*.

Si tratta di un habitat a carattere primario, rupestre, che si sviluppa in formazioni discontinue, su diversi tipi di substrato roccioso con preferenza per i tipi carbonatici, in prevalenza nelle fasce costiere con costante esposizione solare.

Questa macchia è tipica delle coste del Mediterraneo occidentale, ma raggiunge il mediterraneo centrale, arricchendosi anche di ingressioni floristiche orientali. In Italia è sporadicamente presente lungo le coste tirreniche, dalla Liguria fino alla Calabria, più rappresentate in Sicilia e Sardegna.

L'habitat è raro e occupa piccole superfici, a distribuzione frammentaria e a mosaico con altri tipi di macchie xerothermofile, pertanto è cartografato solo quando assume dimensioni significative e la sua identificazione è chiara rispetto agli habitat contigui.

Regione Biogeografica

Mediterranea

Macrobioclina

Mediterraneo

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Piano Altitudinale

Costiero/Collinare

Geoambienti

Ambienti rupestri, pendii rocciosi costieri e collinari, di diversa natura litologica, preferenzialmente carbonatica.

Riferimenti sintassonomici

Chamaeropo-Quercetum cocciferae Brullo et Marcerò 1985;
Chamaeropo-Sarcopoterietum spinosi Barbagallo, Brullo, Fagotto 1979;
Pistacio lentisci-Chamaeropetum humilis Brullo e Marcenò 1985;
Chamaeropo humilis-Juniperetum turbinatae De Marco, Dinelli & Caneva 1985;
Prasio majoris-Quercetum ilicis Bacchetta, Bagella, Biondi, Farris, Filigheddu & Mossa 2004.

Specie guida

<i>Chamaerops humilis</i> L.		
------------------------------	--	--

Interesse conservazionistico nazionale

Habitat primario ad elevata naturalità che ospita l'unica specie di palma autoctona italiana, al limite orientale del suo areale, frammentato in stazioni di piccole dimensioni, testimoni di una caratteristica vegetazione della fascia costiera del bacino del mediterraneo occidentale a clima arido.

Alcune stazioni possono essere minacciate dallo sviluppo di edilizia costiera o da invasione di specie alloctone, tra cui *Opuntia* sp.pl., *Agave* sp.pl., *Carpobrotus* spp, *Eucalyptus* spp., *Acacia* spp.

A livello europeo l'interesse conservazionistico è contemplato in All. 1 della Direttiva 92/43/CEE con l'Habitat 5330 e in All. A della *European Red List of habitats* con l'habitat F5.5, di categoria *Vulnerable*.

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaeartic 2001

=	32.24-Palmetto brush
---	----------------------

EUNIS 2012

=	F5.54- <i>Chamaerops humilis</i> brush
---	--

Direttiva Habitat 92/43/CEE (EUR28)

<	5330-Thermo-Mediterranean and pre-desert scrub
---	--

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

<	5330-Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
---	---

European Red List of Habitats 2022

<	F5.5-Thermomediterranean scrub	Categoria EU28: <i>Vulnerable</i>	
---	--------------------------------	-----------------------------------	--

Autori

Scheda: Lucilla Laureti

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco