


Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

D.42A

Macchia a ginestre termomediterranee

Ultimo aggiornamento: 14/11/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Macchia a ginestre termomediterranee caratterizzata dalla presenza dominante di diverse specie dei generi *Genista* e *Cytisus*, spesso endemiche.

Si tratta di un habitat a carattere primario, che si sviluppa in prossimità della costa su piccole superfici, raro e localizzato, su pendii ad acclività variabile e diversi tipi di substrato, da rocciosi a detritici a sabbiosi.

Si differenziano diverse varianti a seconda delle località e delle specie endemiche ivi presenti: in Campania, lungo la costa cilentina con *Genista cilentina*; in Sicilia e Calabria con aspetti pre-desertici a *Retama raetam*; alle Isole Eolie con *Cytisus aeolicus* e a Pantelleria con *Genista aspalathoides* su substrati vulcanici.

Le garighe costiere a ginestre endemiche della Sardegna sono inserite nell'habitat delle *Frigane a ginestre della Sardegna* (D.445), mentre le formazioni caratterizzate da *Cytisus laniger*, *Cytisus spinosus*, *Cytisus infestus* sono da riferire all'habitat specifico D.423.

L'habitat è in contatto e forma mosaici con altri tipi di macchie termomediterranee, pertanto è cartografato quando assume dimensioni e caratteri che lo identificano chiaramente rispetto alle formazioni adiacenti.

Regione Biogeografica

Mediterranea

Macrobioclimate

Mediterraneo

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Piano Altitudinale

Costiero/Planiziale/Collinare

Geoambienti

Pendii costieri e collinari ad acclività variabile; su diversi tipi di substrato, da rocciosi a detritici a sabbiosi, anche con processi erosivi in atto.

Riferimenti sintassonomici

Calicotomo villosae-Genistion tyrrhenae Biondi 1997.

Specie guida

<i>Cytisus aeolicus</i> Guss.		Isole Eolie (Stromboli, Alicudi e Vulcano)
<i>Genista aspalathoides</i> Lam.		Pantelleria
<i>Genista cilentina</i> Vals.		Costa cilentina
<i>Genista demarcoi</i> Brullo, Scelsi & Siracusa		Sicilia
<i>Genista gasparrinii</i> (Guss.) C.Presl		Sicilia
<i>Genista tyrrhena</i> Vals. subsp. <i>tyrrhena</i>		Sicilia
<i>Retama raetam</i> (Forssk.) Webb & Berthel. subsp. <i>gussonei</i> (Webb) Greuter		Sicilia e Calabria

Interesse conservazionistico nazionale

Habitat ad elevata naturalità, di grande valore floristico per la presenza di specie rare ed endemiche, in Italia frammentato e localizzato in stazioni di piccole dimensioni.

L'habitat è minacciato dagli incendi, dallo sviluppo di edilizia, da pressioni derivanti da attività turistiche costiere, dall'espansione dei terreni agricoli e da invasione di specie alloctone, tra cui *Opuntia* spp., *Pinus* spp., *Eucalyptus* spp., *Acacia* spp..

A livello europeo l'interesse conservazionistico è contemplato in All. 1 della Direttiva 92/43/CEE con l'Habitat 5330.

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaeartic 2001

=	32.26-Thermo-mediterranean broom fields (<i>retamares</i>)
---	--

EUNIS 2012

=	F5.56-Thermo-Mediterranean broom fields (<i>retamares</i>)
---	--

Direttiva Habitat 92/43/CEE (EUR28)

<	5330-Thermo-Mediterranean and pre-desert scrub
---	--

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

<	5330-Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
---	---

European Red List of Habitats 2022

<	F6.1b-Western acidophilous garrigue	Categoria EU28: <i>Least Concern</i>	
---	-------------------------------------	--------------------------------------	--

Autori

Scheda: Lucilla Laureti

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco