


Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

D.433

Garighe a eriche termomediterranee

Ultimo aggiornamento: 14/11/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Garighe termomediterranee dominate dalla presenza di *Erica multiflora* o *Erica forskali*, cui si accompagnano altre specie xerotermofile calcifile della macchia mediterranea, tra le quali *Salvia rosmarinus* è generalmente codominante.

Si sviluppa su substrati carbonatici, versanti anche a forte pendenza, su suoli superficiali, xerici e fortemente drenanti, principalmente nella fascia costiera, spingendosi verso l'interno fino a quote collinari.

L'habitat ha areale preferenziale nel Mediterraneo occidentale, ma si estende fino a quello orientale. In Italia è presente, pur se in modo discontinuo, in Sardegna, Sicilia, Pantelleria e nella fascia termomediterranea dell'Italia centrale e meridionale, più diffusamente nel versante tirrenico.

Raramente è di origine primaria, con formazioni stabili; molto più frequentemente rappresenta stadi di degrado di boschi di sclerofille.

Regione Biogeografica

Mediterranea

Macrobioclina

Mediterraneo

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Piano Altitudinale

Costiero/Collinare

Geoambienti

Pendii da costieri a collinari anche a forte pendenza e soggetti ad erosione, su substrati di natura carbonatica, con suoli superficiali e xerici, fortemente drenanti.

Riferimenti sintassonomici

Ampelodesmo mauritanici-Ericetum multiflorae Arrigoni et Di Tomm. 1997;
Micromerio fruticosae-Ericetum multiflorae Brullo et Marcenò 1983;
Saturejo cuneifoliae-Ericetum manipuliflorae Brullo, Minissale e Spampinato, 1986;
Helichryso scandentis-Ericetum multiflorae Brullo et al. 1993;
Erico-Polygaletum preslii Marcenò. & Colombo 1982;
Erico multiflorae-Rosmarinetum officinalis Di Pietro, Filesi & Blasi 2002;
Erico multiflorae-Halimietum halimifolii Taffetani & Biondi 1992;
Chamaecytiso suspinescenti-Ericetum multiflorae Fascetti, 1996.

Specie guida

<i>Erica forskalii</i> Vitm.		
<i>Erica multiflora</i> L. subsp. <i>multiflora</i>		
<i>Salvia officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>		
<i>Salvia rosmarinus</i> Schleid.		
<i>Teucrium polium</i> L. subsp. <i>polium</i>		
<i>Thymelaea hirsuta</i> (L.) Endl.		

Interesse conservazionistico nazionale

Habitat con buon livello di naturalità, espressione di una vegetazione tipica mediterranea, poco diffuso e a distribuzione frammentaria. Le stazioni prossime a centri urbani possono essere minacciate dallo sviluppo di edilizia costiera o altre forme di pressioni antropiche.

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaeartic 2001

=	32.212-Thermo-Mediterranean heath-garrigues
---	---

EUNIS 2012

=	F5.512-Thermo-Mediterranean heath-garrigues
---	---

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

European Red List of Habitats 2022

<	F6.1a-Western basiphilous garrigue	Categoria EU28: <i>Least Concern</i>	
---	------------------------------------	--------------------------------------	--

Autori

Scheda: Lucilla Laureti

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco