

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

D.443**Frigane a *Hypericum aegyptiacum***

Ultimo aggiornamento: 14/11/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Habitat xerico ad arbusti bassi, spinosi e pulvinati, di ambito termomediterraneo, la cui specie dominante è *Hypericum aegyptiacum*, rilevata in Italia solamente in Sicilia e Sardegna.

Presente principalmente in ambiente costiero, l'habitat predilige la sommità di falesie o comunque pendii scoscesi su rocce calcaree con poco suolo. In Italia, oltre che sulle scogliere costiere a Lampedusa, è conosciuta un'unica stazione in Sardegna, su rupi carbonatiche interne all'isola, e precisamente nel Sarcidano.

Si tratta dunque di formazioni rarissime, limitate in stazioni di piccole dimensioni, resistenti al pascolo e al fuoco, per lo più a carattere secondario, inserite nella dinamica tra la vegetazione alo-xerofila rupestre, principalmente costiera, e quella di formazioni termomediterranee più mature. Pertanto l'habitat è cartografato solo dove assume dimensioni significative.

Regione Biogeografica

Mediterranea

Macrobioclina

Mediterraneo

Piano Altitudinale

Costiero/Collinare

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Geoambienti

Sommità di falesie, scogliere, promontori e pendii ripidi, assolati, su substrati carbonatici xerici e con poco suolo.

Riferimenti sintassonomici

E' conosciuto il riferimento per la comunità dell'isola di Lampedusa: *Triadenio aegyptiacae-Chiliadenetum lopadusani* Bartolo, Brullo, Minissale & Spampinato 1990, mentre non è ben definito quello per la stazione sarda.

Specie guida

<i>Hypericum aegypticum</i> L.	dominante	
--------------------------------	-----------	--

Interesse conservazionistico nazionale

Habitat estremamente raro e localizzato, le cui stazioni italiane costituiscono gli esempi più occidentali di garighe ad areale centrato nel Mediterraneo orientale, dunque di interesse fitogeografico. La vegetazione è costituita da entità altamente specializzate e dominata da *Hypericum aegypticum*, specie rara in Italia.

Sebbene l'habitat sia presente in luoghi isolati e spesso poco accessibili, per alcune stazioni non sono da escludere pressioni dovute ad attività antropiche costiere, o ingressione di specie alloctone tra le quali *Agave americana* L., *Carpobrotus acinaciformis* (L.) L. Bolus, *Carpobrotus edulis* (L.) N.E. Br., *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill.

A livello europeo l'interesse conservazionistico è contemplato in All.1 della Dir. 92/43/CEE con l'Habitat 5430.

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaearctic 2001

=	33.5- <i>Hypericum phryganas</i>
---	----------------------------------

EUNIS 2012

=	F7.26- <i>Hypericum aegyptiacum</i> phrygana
---	--

Direttiva Habitat 92/43/CEE (EUR28)

<	5430-Endemic phryganas of the <i>Euphorbio-Verbascion</i>
---	---

Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

<	5430-Frigane endemiche dell' <i>Euphorbio-Verbascion</i>
---	--

European Red List of Habitats 2022

Sebbene la specie *Hypericum aegyptiacum* non sia esplicitamente citata negli habitat della European Red List, si ritiene che si possa includere nell'habitat *Eastern Mediterranean spiny heath (phrygana)* (F7.3) di categoria EU28 Least Concern.

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Autori

Scheda: Lucilla Laureti

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco