

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

E.113**Faggete xerofile delle Alpi**

Ultimo aggiornamento: 14/11/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Boschi di faggio xerotermofili, che si sviluppano su pendii acclivi e suoli superficiali, tolleranti di periodi con scarsa umidità e disponibilità idrica, tipicamente su substrati carbonatici.

Sono presenti nei piani collinare e montano della fascia prealpina e alpina delle Alpi.

Il faggio può essere accompagnato da specie arboree xerotermofile, come *Fraxinus ornus* e *Ostrya carpinifolia*; lo strato erbaceo è ricco di *Carex* sp., graminacee ed orchidee. Nel complesso l'habitat è caratterizzato da elevata varietà floristica e da abbondanti fioriture di specie orchideacee nemorali.

Le condizioni stagionali di questo habitat, xeriche e con suoli molto superficiali, impediscono lo sviluppo di faggete più mesofile e su suoli più fertili, come quelle dell'*Asperulo-Fagetum*, incluse nell'habitat E.112, con le quali tuttavia possono essere in contatto.

Nella porzione orientale delle Alpi queste formazioni sono sostituite dalle *Faggete illiriche* (E.114), che a loro volta si caratterizzano per una flora di derivazione orientale.

Regione Biogeografica

Alpina

Macrobioclima

Temperato

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Piano Altitudinale

Collinare/Montano

Geoambienti

Versanti ad elevata acclività su substrato carbonatico, esposizione calda e suoli poveri, poco profondi.

Riferimenti sintassonomici

Cephalanthero-Fagenion R. Tx. in R. Tx. et Oberd. 1958.

Specie guida

<i>Fagus sylvatica</i> L.	dominante	
<i>Berberis vulgaris</i> L.		
<i>Buxus sempervirens</i> L.		
<i>Calamagrostis varia</i> (Schröd.) Host		
<i>Carex alba</i> Scop.		
<i>Carex digitata</i> L.		
<i>Carex flacca</i> Schreb. subsp. <i>flacca</i>		
<i>Carex montana</i> L.		
<i>Cephalanthera</i> spp.		
<i>Epipactis</i> spp.		
<i>Erica carnea</i> L. subsp. <i>carnea</i>		
<i>Fraxinus ornus</i> L. subsp. <i>ornus</i>		
<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.		
<i>Rosa arvensis</i> Huds.		
<i>Sesleria</i> spp.		

Interesse conservazionistico nazionale

Habitat caratterizzato da elevata varietà floristica, anche con specie rare di orchidee, oltre che importante per la fauna selvatica. Può presentare differenti livelli di naturalità a seconda della modalità di gestione forestale e può anche essere interessato, soprattutto alle quote inferiori, da eventuale ingressione da parte di specie alloctone invasive.

A livello europeo l'Interesse conservazionistico è contemplato in All.1 della Dir. 92/43/CEE con l'habitat 9150.

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaeartic 2001

=	41.16-Medio-European limestone beech forests
---	--

EUNIS 2012

=	G1.66-Medio-European limestone <i>Fagus</i> forests
---	---

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Direttiva Habitat 92/43/CEE (EUR28)

=	9150-Medio-European limestone beech forests of the <i>Cephalanthero-Fagion</i>
---	--

Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

=	9150-Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del <i>Cephalanthero-Fagion</i>
---	---

European Red List of Habitats 2022

<	G1.6a- <i>Fagus</i> woodland on non-acid soils	Categoria EU28: <i>Near Threatened</i>	
---	--	--	--

Autori

Scheda: Lucilla Laureti

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco