

## Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

### E.115

### Faggete dell'Appennino settentrionale e centrale

Ultimo aggiornamento: 10/11/2025



DISTRIBUZIONE

### Descrizione

Boschi e foreste dominate dal faggio (*Fagus sylvatica*), tipiche del piano montano dell'Appennino settentrionale e centrale. In questo habitat sono comprese sia le faggete su suoli basici non particolarmente evoluti che quelle su suoli acidi o acidificati e piuttosto evoluti.

Nelle fasce più basse la faggeta è generalmente mista, accompagnata da diverse specie arboree come cerri, castagni ed aceri, mentre più in alto diviene pura. In alcune località possono essere presenti, generalmente in modo sporadico, esemplari o piccoli nuclei di *Abies alba* e, ancora meno frequenti, *Ilex aquifolium* e *Taxus baccata*. Il sottobosco è generalmente povero, composto da una mistura di specie in massima parte medio-europee, localmente anche oromediterranee, con presenza di endemismi locali.

Questo habitat rappresenta il bosco terminale dell'Appennino settentrionale e centrale, ed è l'habitat di riferimento per identificare il piano montano. Si estende su un ampio range altitudinale: da quote massime attorno ai 1900 metri la faggeta scende, nelle valli e nei versanti ad esposizione settentrionale, più umidi, freddi e poco soleggiati, fino a 700 m s.l.m. circa ed anche più in basso. Infatti faggete depresse, legate a condizioni locali particolari, possono trovarsi anche a quote inferiori, tipiche del piano collinare.

Le *Faggete dell'Appennino settentrionale e centrale* sono boschi molto diffusi, che coprono grandi estensioni, mantenendo una buona continuità sui rilievi appenninici dalla Liguria all'Abruzzo, mentre risultano discontinui lungo i rilievi della catena antiappenninica.

Comprese nell'ambito forestale possono essere presenti radure di dimensioni inferiori all'ettaro e pertanto non cartografabili.

Nella classificazione di Carta della Natura i boschi non vengono distinti a seconda della loro modalità di gestione: pertanto in questo habitat ricadono tutte le faggete afferenti a questa tipologia, da quelle vetuste a massima naturalità a quelle ceduate.

## Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

### Regione Biogeografica

Alpina/Continental/Mediterranea

### Macrobioclima

Temperato

### Piano Altitudinale

Montano

### Geoambienti

Aree montuose dell'Appennino settentrionale e centrale: versanti, valli, crinali, cime, su qualsiasi tipo di substrato.

### Riferimenti sintassonomici

*Fagion sylvaticae* Luquet 1926.

### Specie guida

|                                                                          |           |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| <i>Fagus sylvatica</i> L.                                                | dominante |                                    |
| <i>Abies alba</i> Mill.                                                  |           |                                    |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> L.                                            |           |                                    |
| <i>Actaea spicata</i> L.                                                 |           | suoli acidi o acidificati o neutri |
| <i>Allium pendulinum</i> Ten.                                            |           | suoli basici                       |
| <i>Allium ursinum</i> L.                                                 |           | suoli basici                       |
| <i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth                               |           | suoli basici                       |
| <i>Cardamine kitaibelii</i> Bech.                                        |           | suoli acidi o acidificati o neutri |
| <i>Centaurea montana</i> L.                                              |           | suoli acidi o acidificati o neutri |
| <i>Cytisus villosus</i> Pourr.                                           |           | suoli acidi o acidificati o neutri |
| <i>Dactylorhiza</i> spp.                                                 |           | suoli acidi o acidificati o neutri |
| <i>Daphne laureola</i> L.                                                |           | suoli basici                       |
| <i>Daphne mezereum</i> L.                                                |           | suoli acidi o acidificati o neutri |
| <i>Epilobium montanum</i> L.                                             |           |                                    |
| <i>Epipactis</i> spp.                                                    |           | suoli acidi o acidificati o neutri |
| <i>Geranium nodosum</i> L.                                               |           | suoli acidi o acidificati o neutri |
| <i>Ilex aquifolium</i> L.                                                |           | suoli basici                       |
| <i>Laburnum anagyroides</i> Medik. subsp. <i>anagyroides</i>             |           | suoli basici                       |
| <i>Lathyrus venetus</i> (Mill.) Wohlf.                                   |           | suoli basici                       |
| <i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott subsp. <i>luzuloides</i> |           | suoli acidi o acidificati o neutri |
| <i>Luzula pedemontana</i> Boiss. & Reut.                                 |           | suoli acidi o acidificati o neutri |
| <i>Monotropa hypopitys</i> L.                                            |           | suoli acidi o acidificati o neutri |
| <i>Oxalis acetosella</i> L.                                              |           | suoli acidi o acidificati o neutri |
| <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth                                   |           | suoli basici                       |
| <i>Rosa pendulina</i> L.                                                 |           | suoli acidi o acidificati o neutri |

## Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

|                                                             |  |                                    |
|-------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|
| <i>Ruscus aculeatus</i> L.                                  |  | suoli basici                       |
| <i>Sanicula europaea</i> L.                                 |  | suoli basici                       |
| <i>Saxifraga rotundifolia</i> L. subsp. <i>rotundifolia</i> |  | suoli basici                       |
| <i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>virgaurea</i>        |  | suoli acidi o acidificati o neutri |
| <i>Staphylea pinnata</i> L.                                 |  | suoli acidi o acidificati o neutri |
| <i>Taxus baccata</i> L.                                     |  | suoli basici                       |
| <i>Trochiscanthes nodiflora</i> (All.) W.D.J.Koch           |  | suoli acidi o acidificati o neutri |
| <i>Veronica urticifolia</i> Jacq.                           |  | suoli acidi o acidificati o neutri |
| <i>Viola</i> spp.                                           |  | suoli basici                       |

### Interesse conservazionistico nazionale

Boschi di origine primaria e di grande diffusione ed estensione nell'Appennino settentrionale e centrale, dove rappresentano il tipico bosco montano terminale.

La loro naturalità e valore ambientale sono legati alle modalità di gestione forestale ed allo stato di sviluppo del bosco, dai massimi delle faggete vetuste fino ai minimi delle faggete soggette a forte ceduzione.

### Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

#### Palaeartic 2001

|   |                                             |
|---|---------------------------------------------|
| < | 41.17-Southern medio-European beech forests |
|---|---------------------------------------------|

L'habitat Palaeartic 41.17 ha un areale esteso dal versante meridionale delle Alpi ai Pirenei ed alle altre montagne del mediterraneo occidentale. L'habitat Carta della Natura E.115 è specifico dell'Appennino settentrionale e centrale.

#### EUNIS 2012

|   |                                                    |
|---|----------------------------------------------------|
| < | G1.67-Southern medio-European <i>Fagus</i> forests |
|---|----------------------------------------------------|

L'habitat EUNIS G1.67 ha un areale esteso dal versante meridionale delle Alpi ai Pirenei ed alle altre montagne del mediterraneo occidentale. L'habitat Carta della Natura E.115 è specifico dell'Appennino settentrionale e centrale.

#### Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

|    |                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <> | 9110-Faggeti del <i>Luzulo-Fagetum</i>                                                     |
| <> | 9130-Faggeti dell' <i>Asperulo-Fagetum</i>                                                 |
| <> | 9210*-Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>                               |
| <> | 9220*-Faggeti degli Appennini con <i>Abies alba</i> e faggete con <i>Abies nebrodensis</i> |

Il Manuale italiano, a differenza di quello europeo, inserisce i seguenti habitat di Direttiva, seppure in modo parziale, in habitat Palaeartic afferenti all'habitat 41.17, e di conseguenza all'habitat E.115 di Carta della Natura:

-9110, che comprende 41.171 (*Southern Alpine and Apennine acidophilous beech forests*);

-9130, che comprende 41.174 (*Southern Alpine and Apennine neutrophile beech forests*);

-9210\*, che comprende 41.1742 (*Maritime Alps neutrophile beech forests*) e 41.1744 (*Northern Apennine neutrophile beech forests*);

-9220\*, che comprende 41.171 (*Alpino-Apennine acidophilous beech forests*), 41.174 (*Alpino-Apennine neutrophile beech forests*) e 41.175 (*Sub-Mediterranean calcicolous beech forests*).

Tuttavia, poiché l'habitat E.115 di Carta della Natura ha un significato più esteso, la effettiva attribuzione a questi habitat di interesse comunitario va verificata caso per caso.

Inoltre l'habitat E.115 di Carta della Natura potrebbe parzialmente includere, seppure in modo occasionale e non caratteristico, aspetti dell'habitat di Direttiva 9120 (*Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex e a volte di Taxus (Quercion roboreae o Ilici-Fagion)*).

## Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

### European Red List of Habitats 2022

|    |                                                |                                        |  |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| <> | G1.6a- <i>Fagus</i> woodland on non-acid soils | Categoria EU28: <i>Near Threatened</i> |  |
| <> | G1.6b- <i>Fagus</i> woodland on acid soils     | Categoria EU28: <i>Near Threatened</i> |  |

Con gli habitat G1.6a e G1.6b la European Red List comprende tutte i boschi di faggio presenti in Europa, quindi anche la variante specifica dell'Appennino settentrionale e centrale che Carta della Natura individua con l'habitat E.115.

### Autori

Scheda: Roberto Bagnaia, Lucilla Laureti

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco