


Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

E.241

Boschi e boscaglie a *Olea europaea* e *Ceratonia siliqua*

Ultimo aggiornamento: 24/09/2025



DISTRIBUZIONE

Descrizione

Boschi e boscaglie caratterizzati dalla presenza dominante di *Olea europaea* e/o *Ceratonia siliqua*, in forma arborea, con la partecipazione di altre specie termofile sempreverdi tipiche della macchia mediterranea a sclerofille.

L'habitat è presente nell'area termomediterranea, nella fascia costiera o al massimo collinare, su substrati di diversa natura, in Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia.

In base alla specie arborea dominante si distinguono gli oleastreti e i carrubeti.

I primi possono essere considerati per lo più formazioni climatofile, che costituiscono spesso formazioni molto compatte, con esemplari arborei di altezza tra i 2 e i 5 metri. Sono ben rappresentati anche come componente paesaggistica della fascia costiera nelle zone più calde.

I carrubeti invece sono molto rari, frammentati, e più che da vere e proprie boscaglie sono caratterizzati da esemplari radi in formazioni aperte. Spesso sono frammisti agli oleo-lentisceti, presenti sia in prossimità di corsi d'acqua, sia in ambienti collinari.

Questo habitat comprende anche antichi oliveti e coltivazioni di carrubo abbandonati e rinaturalizzati.

Da evidenziare che queste formazioni coesistono con i *Matorral a olivastro*, *lentisco*, *carrubo* (D.414), poiché si tratta di habitat che occupano la medesima nicchia ecologica e dinamicamente collegati: la loro distinzione si effettua sulla base della diversa struttura della vegetazione.

Regione Biogeografica

Mediterranea

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Macrobioclima

Mediterraneo

Piano Altitudinale

Costiero/Planiziale/Collinare

Geoambienti

Pendii costieri, versanti collinari su differenti substrati, valli e vallecicole.

Riferimenti sintassonomici

Oleo-Ceratonion siliquae Br.-Bl. ex Guinochet et Drouineau 1944;

Quercion ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martinez 1975.

Specie guida

<i>Ceratonia siliqua</i> L.	dominante e codominante	
<i>Olea europaea</i> L.	dominante e codominante	
<i>Asparagus acutifolius</i> L.		
<i>Asparagus albus</i> L.		
<i>Chamaerops humilis</i> L.		
<i>Cyclamen repandum</i> Sm. subsp. <i>repandum</i>		
<i>Euphorbia dendroides</i> L.		
<i>Phillyrea angustifolia</i> L.		
<i>Pistacia lentiscus</i> L.		
<i>Rhamnus alaternus</i> L. subsp. <i>alaternus</i>		

Interesse conservazionistico nazionale

Gli oleastreti, per lo più formazioni climatofile, sono diffusi nelle zone più calde mediterranee, anche come elemento tipico del paesaggio nella fascia costiera, ed in espansione per l'abbandono delle attività pastorali.

Le formazioni a carrubo sono estremamente rare e molto frammentate. Il notevole impatto antropico che ha interessato le aree di sviluppo dell'habitat ha infatti distrutto gran parte dei carrubeti, una volta molto più diffusi anche per via degli svariati utilizzi dei suoi frutti.

A livello europeo l'interesse conservazionistico è contemplato in All.1 della Dir. 92/43/CEE con l'habitat 9320.

Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

Palaearctic 2001

=	45.1-Olive-carob forests
---	--------------------------

EUNIS 2012

=	G2.4-Olea europaea - Ceratonia siliqua woodland
---	---

Direttiva Habitat 92/43/CEE (EUR28)

=	9320-Olea and Ceratonia forests
---	---------------------------------

Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

=	9320-Foreste di Olea e Ceratonia
---	----------------------------------

European Red List of Habitats 2022

=	G2.4-Olea europaea-Ceratonia siliqua woodland	Categoria EU28: <i>Least Concern</i>	
---	---	--------------------------------------	--

Autori

Scheda: Lucilla Laureti

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco