

**Legenda degli habitat in Carta della Natura**

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

**F.127****Dossi sabbiosi interni**

Ultimo aggiornamento: 13/11/2025



DISTRIBUZIONE

**Descrizione**

Dossi costituiti da depositi sabbiosi interni di origine fluviale e fluvio-glaciale, non costieri, caratterizzati da suoli silicatici secchi e acidi, poveri di nutrienti e poco sviluppati, con vegetazione rada e paucispecifica, costituita da praterie discontinue aride ricche di muschi e licheni. Sono presenti come formazioni residuali nella Pianura Padana, in ambito biogeografico continentale.

La presenza accertata di questo habitat in Italia è limitata a piccoli lembi in due località in provincia di Pavia, identificate con i toponimi dossi di Remondò e di Cernago e nel tratto medio e superiore del Fiume Ticino, in connessione con la fascia di esondazione fluviale. L'habitat è rappresentato da prati radi e zone con sabbie affioranti, frammentato in un mosaico costituito da boschi aperti, boschi d'invasione a robinia, coltivi, risaie e piantagioni di pioppo.

I *Dossi sabbiosi interni* coprono estensioni molto ridotte, al limite della cartografabilità.

**Regione Biogeografica**

Continente

**Macrobioclimate**

Temperato

## Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

### Piano Altitudinale

Planiziale/Collinare

### Geoambienti

Questo habitat, costituito dal punto di vista geomorfologico da dossi formati da depositi fluviali e fluvio-glaciali quaternari, è ubicato in ambienti di pianura di alcuni corsi d'acqua appartenenti al bacino del Fiume Po. Il substrato è sabbioso-arenaceo, con suoli poveri e poco sviluppati.

### Riferimenti sintassonomici

*Corynephorion canescentis* Klika 1931.

### Specie guida

|                                              |  |          |
|----------------------------------------------|--|----------|
| <i>Ceratodon purpureus</i> (Hedw.) Brid.     |  | briofito |
| <i>Cetraria aculeata</i> (Schreb.) Fr.       |  | lichene  |
| <i>Cladonia foliacea</i> (Huds.) Willd.      |  | lichene  |
| <i>Cladonia furcata</i> (Huds.) Schrad.      |  | lichene  |
| <i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv.  |  |          |
| <i>Festuca lachenalii</i> (C.C.Gmel.) Spenn. |  |          |
| <i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort.           |  |          |
| <i>Stereocaulon condensatum</i> Hoffm.       |  | lichene  |
| <i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br.       |  |          |

### Interesse conservazionistico nazionale

Habitat residuale raro, localizzato in contesti ambientali estremamente caratteristici, a cominciare dal punto di vista geomorfologico, e limitato a poche e piccole stazioni. La vegetazione è costituita da poche specie caratteristiche. I siti dove è stata accertata la sua presenza sono fortemente a rischio per una serie di fattori concomitanti che nel tempo hanno portato a una sua riduzione e frammentazione, quali l'ampliamento delle attività agricole e le modifiche all'habitat provocate dall'introduzione di specie esotiche.

A livello europeo l'interesse conservazionistico è contemplato in All.1 della Direttiva 92/43/CEE con l'habitat 2330 e in All. A della *European Red List of habitats* con l'habitat E1.9b, di Categoria Endagered.

### Relazioni con altri sistemi di classificazione europea

#### Palaeartic 2001

|   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| > | 35.2-Medio-European open siliceous grasslands |
| > | 64.4-Fluviatile dunes                         |

La classificazione Palaeartic dettaglia in habitat diversi ambienti distinti su base geomorfologica e/o fitosociologica, che si presentano di norma mosaicati ed a volte sovrapponibili (64.4 e 35.2). Carta della Natura li raggruppa, anche per esigenze cartografiche, nell'habitat F.127.

## Legenda degli habitat in Carta della Natura

(per la cartografia alla scala 1:25.000)

### EUNIS 2012

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| = | E1.97-Southern fluviatile dunes |
|---|---------------------------------|

### Direttiva Habitat 92/43/CEE (EUR28)

|   |                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| ~ | 2330-Inland dunes with open <i>Corynephorus</i> and <i>Agrostis</i> grasslands |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|

Il Manuale Europeo considera nell'habitat 2330 gli habitat Palaearctic 64.11, 64.12 e 35.2, ma non l'habitat 64.4; Carta della Natura ha riunito gli habitat 64.4 e 35.2 nell'habitat F.127, che fa riferimento alle specificità italiane dell'habitat.

### Direttiva Habitat 92/43/CEE (Manuale Italiano)

|   |                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| = | 2330-Praterie aperte a <i>Corynephorus</i> e <i>Agrostis</i> su dossi sabbiosi interni |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|

Gli Autori del Manuale Italiano affermano che questo habitat in Italia "potrebbe essere considerato prioritario, per il numero limitato di stazioni in cui è presente".

### European Red List of Habitats 2022

|   |                                                          |                                   |  |
|---|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| ~ | E1.9b-Inland sanddrift and dune with siliceous grassland | Categoria EU28: <i>Endangered</i> |  |
|---|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|

### Autori

Scheda: Roberto Bagnaia

Riferimenti sintassonomici e Specie guida: Pietro Bianco